

5—6 脉,无痂体;雄蕊长约 2.2 毫米,花丝钻形;花盘环状;子房近下位,长约 2 毫米,花柱长约 1.5 毫米。花期 6—7 月。

产新疆(塔什库尔干)、云南(中甸、贡山)、西藏(普兰)。生于海拔 3 900—5 200 米的岩石缝隙。锡金、尼泊尔、印度、克什米尔地区均有。模式标本采自印度西姆拉。

189. 南布拉虎耳草(西藏植物志)

*Saxifraga nambulana* H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(4): 108. f. 6a—c. 1958; 西藏植物志 2: 515. 1985.

多年生草本;小主轴极多分枝,叠结呈座垫状,长达 3 厘米。花茎长不及 1 厘米,被长腺柔毛。小主轴之叶覆瓦状排列,匙状狭倒卵形,长达 5.5 毫米,宽约 2 毫米,先端通常具小尖头且无毛,革质,增厚,具 5 窝孔,两面无毛,边缘软骨质,且其中下部具细齿状睫毛;茎生叶 4—6 枚,长约 5 毫米,先端急尖,近革质,具 1 窝孔,背面和基部边缘具腺柔毛。花单生于茎顶;托杯外面密被长腺柔毛;萼片阔卵形,长约 4 毫米,宽约 3 毫米,先端急尖或近急尖,腹面无毛,背面和边缘具腺柔毛(先端除外);花瓣黄色,椭圆形至倒卵形,长约 7 毫米,宽约 3 毫米,先端钝,基部狭缩成长约 1.5 毫米之爪,3—4 脉,无痂体;雄蕊与花瓣等长或较长;2 心皮下部合生,花柱直立,长约 2 毫米。花期 7—8 月。

产我国西藏(林芝)。生于海拔 4 200 米左右的岩石缝隙。模式标本采自西藏林芝(南布拉)。

190. 对生叶虎耳草(西藏植物志)

*Saxifraga georgei* Anth. in Not. Bot. Gard. Edinb. 18(86): 33. 1933; H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(4): 95. f. 1e—h. 1958; Hara, Fl. E. Himal. 2: 48. 1971; Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 152. 1979; 云南种子植物名录上册: 238. 1984; 西藏植物志 2: 510. 1985.

多年生丛生草本,小主轴极多分枝,叠结呈座垫状,密具叶片 4 列。小主轴之叶对生,较肥厚,卵形,长约 3 毫米,宽约 2 毫米,先端近急尖,具 1 分泌钙质之窝孔,无毛。花单生于茎顶;无花梗;萼片在花期直立,阔卵形,长、宽均约 2 毫米,先端稍钝且无毛,具 1 窝孔,腹面无毛,背面和边缘(除先端外)疏生腺柔毛,3 脉于先端汇合;花瓣白色,倒卵形,长约 5 毫米,宽约 3 毫米,先端钝圆,基部变狭成爪,3—5 脉,无痂体;雄蕊高出萼上;子房卵球形,花柱长。花期 7—8 月。

产四川(木里)、云南(中甸)和西藏东南部。生于海拔 3 636—4 050 米的峭壁石隙。不丹至尼泊尔也有。模式标本采自四川木里。

191. 十字虎耳草(云南种子植物名录)

*Saxifraga decussata* Anth. in Not. Bot. Gard. Edinb. 18(86): 33. 1933; 云南种子植物名录上册: 236. 1984.

多年生丛生草本;小主轴极多分枝,叠结呈座垫状。花茎极短,长约 4 毫米,被淡红色