

端尖。

属的模式种: *Tanakaea radicans* Franch. et Savat.

有 2 种,我国和日本各产 1 种。

1. 峨眉草(中国高等植物图鉴) 岩雪下(植物分类学报) 图版 60:4—6

Tanakaea omeiensis Nakai in Journ. Jap. Bot. **14**(4): 223. f. 1. 1938; 中国高等植物图鉴 **2**: 138. 图 2005. 1972.


多年生草本,高 6.5—12.3 厘米;根状茎横走,直径约 2 毫米。叶均基生,叶片椭圆形、卵形至圆状阔卵形,长 1.1—3 厘米,宽 0.8—2.9 厘米,先端急尖,边缘具粗锯齿,基部圆形或稍心形,两面被褐色柔毛(有的带腺头),叶柄长 1.1—6.5 厘米,被褐色柔毛(有的带腺头)。花葶疏生腺柔毛。总状花序长 2.8—3.5 厘米,被褐色腺柔毛;萼片狭卵形至披针形,长 1.5—1.9 毫米,宽 0.4—0.6 毫米,先端急尖,两面无毛,边缘具极少腺毛,单脉;无花瓣;雄蕊 8—10,花丝长 3.3—3.5 毫米;2 心皮下部合生,长约 4 毫米,子房近上位,花柱 2。蒴果长约 4 毫米,2 果瓣叉开。 花果期 4—10 月。

产四川(峨眉、屏山、南川)。生于海拔 900—1100 米的阴湿石隙。模式标本采自四川峨眉山。

13. 金腰属——*Chrysosplenium* Tourn. ex L.

L. Sp. Pl. ed. 1. 1: 398. 1753 et Gen. Pl. ed. 5. 189. 1754; DC. Prodr. 4:48. 1830; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1:638. 1865; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. **23**:340. 1877 et in ibid. **27**:467. 1881; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris sér. 3. **2**:97. 1890 et in ibid. **3**: 1. 1891; Engl. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. **3**(2a): 64. 1890 et in ibid. ed. 2. 18a: 162 1928; Hara in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Bot. **7**: 9. 1957; J.T. Pan in Acta Phytotax. Sin. **24** (2): 82. 1986.

多年生小草本,通常具鞭匍枝或鳞茎。单叶,互生或对生,具柄,无托叶。通常为聚伞花序,围有苞叶,稀单花;花小型,绿色、黄色、白色或带紫色;托杯内壁通常多少与子房愈合;萼片 4,稀 5,在芽中覆瓦状排列;无花瓣,花盘极不明显或无,或明显(4)8 裂,有时其周围具褐色乳头状突起;雄蕊 8(10)或 4;花丝钻形,花药 2 室,侧裂,花粉粒微细,具 3 拟孔沟,并具华美网纹;2 心皮通常中下部合生,子房近上位、半下位或近下位,1 室,胚珠多数,具 2 侧膜胎座,花柱 2,离生,柱头具斑点。蒴果之 2 果瓣近等大或明显不等大;种子多数,卵球形至椭圆球形,有时光滑无毛,有时具微乳头状突起、微柔毛或微瘤突,有时具纵肋,肋上具横纹、乳头状突起或微瘤突等。染色体 $2n = 18, 22, 24, 36, 42, 48, 96$ 。



1—3. 台湾唢呐草 *Mitella formosana* (Hayata) Masam.: 1. 全株, 2. 叶柄之腺毛放大, 3. 花展开。
 4—6. 峨屏草 *Tanakaea omeiensis* Nakai: 4. 全株, 5. 萼片, 6. 幼果。7—13. 秦岭金腰 *Chrysosplenium biondianum* Engl.: 7. 全株, 8. 花序, 9. 雄花, 10. 雌花, 11. 示子房, 12. 蒴果, 13. 种子。
 (潘锦堂、王颖绘)