

头突起。聚伞花序长 1.3—6 厘米,具 8—18 花;苞叶阔卵形,长 3.2—6.8 毫米,宽 3.2—6.5 毫米,边缘具 5—10 圆齿,基部通常宽楔形,稀偏斜形,苞腋具褐色乳头突起;花黄绿色,直径约 3 毫米;花梗无毛;萼片在花期直立,近阔卵形,长 1.1—1.3 毫米,宽 1—1.2 毫米,先端钝圆,无毛;雄蕊 8,长 0.5—1.3 毫米;子房近下位,花柱长约 0.2 毫米;无花盘。蒴果长约 2.6 毫米,2 果瓣近等大,喙长约 0.4 毫米;种子红棕色,椭圆形,长约 1 毫米,光滑无毛。染色体  $2n = 24$ 。 花果期 5—7 月。

产四川、云南和西藏。生于海拔 1550—5850 米之林下、草甸或石隙。缅甸北部、不丹、锡金、尼泊尔和印度北部均有。模式标本采自尼泊尔。

26. **大武金腰**(植物分类学报) 大武猫儿眼睛草(台湾植物志)

**Chrysosplenium hebetatum** Ohwi in Fedde Repert. Sp. Nov. 36: 52. 1934; Hara in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Bot. 7: 43. f. 9A. 1957; 台湾植物志 3: 30. 1977; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 24(3): 204. 1986.

多年生草本,高 4—10 厘米;根状茎较长;不育枝出自叶腋,被长柔毛,其叶对生,阔卵形至扇状卵形,边缘具 4—8 圆齿(不明显),基部宽楔形,腹面与叶柄具长柔毛。花茎疏生长柔毛。基生叶具柄,叶片阔卵形,长与宽均为 7—15 毫米,边缘具 6—8 圆齿(不明显),基部宽楔形,疏生柔毛;茎生叶对生,4—6 枚,圆状阔卵形、近菱形至扇形,长与宽均为 5—10 毫米,边缘具 4—6 圆齿,基部宽楔形,疏生柔毛,叶柄长 2—4 毫米,被长柔毛。聚伞花序具少花;苞叶小,倒卵形,边缘具 2—6 圆齿,基部楔形;花绿色,直径 2—3 毫米;萼片在花期直立,阔卵形至近圆形,长 1.5—2 毫米,先端钝圆;雄蕊 8,花丝长约 1 毫米。蒴果之 2 果瓣近直伸,喙长 0.5—0.8 毫米;种子深褐色,近椭圆形,长约 0.5 毫米,光滑无毛,但具波状横纹。 花期 4—5 月。

产我国台湾省。生于山地林下。模式标本采自我国台湾省。

组 2. 异果瓣组——Sect. Grayana J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 24(3): 204. 1986.——Sect. II. *Oppositifolia* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris sér. 3. 3: 1. 1891, p. p.

组的模式种: *Chrysosplenium grayanum* Maxim.

本组有 4 系,约 9 种。我国有 3 系,4 种。

系 1. 中华金腰系——Ser. Sinica Maxim. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 23: 348. 1877, emend. J. T. Pan.

系的模式种: 中华金腰 *Chrysosplenium sinicum* Maxim.

本系有 2 种;我国均产,其中 1 种为我国特有。

27. **中华金腰**(中国高等植物图鉴) 华金腰子(东北植物检索表), 中华金腰子(秦岭