

无柄，基部抱茎，长约10毫米。花小，长约7毫米；花萼漏斗状筒形，长6—7毫米，深裂；萼筒长约3毫米，裂片窄卵形，长3.5毫米，先端钝；花瓣黄色，匙形或匙状披针形，长5—6毫米，宽约2.5毫米，先端钝；退化雄蕊长约2.5毫米，宽匙形，先端3裂，裂片截形而短；花药长3—4毫米，花丝丝状，药室0.5毫米，广椭圆形。果实未见。

产青海（玛多一带）。模式标本采自青海玛多一带。

本种因未见标本，描述译自原始记载。

23. 兴安梅花草（广西植物）

Parnassia xinganensis C. Z. Gao et G. Z. Li in *Guihaia* **3** (1): 19. fig. 1. 1983; Ku in *Bull. Bot. Res. North-East. For. Univ.* **7** (1): 34. 1987.

多年生草本，高6—15厘米。根状茎伸长，形状不定，粗约4毫米，其上有膜质褐色鳞片，周围具密集多数灰褐色长丝状之根。基生叶密集，4—5（—11），具柄；叶片椭圆形，稀倒卵状椭圆形，长1.8—7厘米，宽1—2.5厘米，先端急尖，具短而圆尖头，基部圆形至楔形，边缘向外面卷，上面绿色，干后呈褐绿色，脉微凹，下面灰白色，密具褐色小点，基出脉5条，中脉明显突起；叶柄长短不等，长1.5—8.5厘米，扁平；托叶膜质，大部分贴生于叶柄，边缘有短而疏的流苏状毛，疏被紫褐色小点。茎2—8条，近中部或稍偏下具1茎生叶，茎生叶卵形或卵状三角形，长1—1.8厘米，宽5—11毫米，先端急尖，带有突起圆头，基部圆形至楔形，边向外反卷，上面深绿色，下面灰绿色，密具褐色小点，其基部常有数条铁锈色的附属物。花单生于茎顶，直径1.5—2厘米；萼筒短陀螺状；萼片5，椭圆形，卵形，稀倒卵形，长4—5毫米，宽2.5—3.5毫米，先端圆钝，具5条脉；花瓣白色，开展，椭圆形，长9—10毫米，宽7—8毫米，先端圆，基部骤然收缩成长约2毫米之爪，边缘全缘，基出脉5条；雄蕊5，花丝长约5毫米，扁平，向基部逐渐加宽，花药椭圆形，长约1毫米，顶生，纵裂；退化雄蕊5，长3—3.5毫米，柄长约1.8毫米，宽约0.5毫米，头部宽约1.5毫米，3裂，其分裂深度为头部长度的1/2，裂片披针形，通常中间裂片比两侧稍窄；子房卵球形，上位，花柱长约1.5毫米，柱头3裂，裂片长圆形，花后反折。花期7—8月。

产广西（兴安县）。生于山地水旁，海拔1200米。模式标本采自兴安县（猫儿山）。

24. 披针瓣梅花草（植物研究）

Parnassia lanceolata Ku in *Bull. Bot. Res. North-East. For. Univ.* **7** (1): 34. pl. 2. fig. 1—6. 1987.

24a. 披针瓣梅花草（原变种）

var. *lanceolata*

矮小草本，高3—7厘米，柔弱。根状茎不规则，其下有多数丝状根，其上有褐色膜质鳞片。基生叶3—5，具柄；叶片卵状肾形，或卵状心形，长4—14毫米，宽5—12毫米，长、宽几相等，先端渐尖而圆，基部心形，全缘，边有一圈窄膜质，上面深绿色，下