


产浙江（吉安）。生于海拔 580 米山谷溪边林下。模式标本采自吉安。

14. 美丽渡疏（中国高等植物图鉴补编） 图版 13：9—15

*Deutzia pulchra* Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. 124. 1886; Schneid. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 13: 180. 1904 et Ill. Handb. Laubh. 2: 931. 1912; Merr. in Philip. Journ. Sci. 1, Suppl. 3: 175. 1906 et 5, 4: 351. 1910; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 18. 1911; Turrill in Curtis's Bot. Mag. 148. tab. 8962. 1923; H. L. Li in Journ. Wash. Acad. Sci. 42: 1952 et Woody Fl. Taiwan 241. 1963; Krüssmann, Handb. Laubgeh 1, 6: 395. 1960; Zaikonn. Дейщин-Декорат. Куст. (Моногр. Deutzia) 44. fig. 10 (9). 12 (3). 13 (6). 1966; Shimizu et M. T. Kao in Fl. Taiwan 3: 32. Pl. 468. 1977; 中国高等植物图鉴补编, 2: 51. 1985. — *D. acuminata* Merr. op. cit. 12: 226. 1917 et op. cit. 2: 218. 1923. — *D. pulchra* var. *typica* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 35: 84. 1921; Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Aufl. 2, 18a: 197. 1930. — *D. pulchra*-Vidal var. *formosana* Nakai l. c.; Engl. l. c.; Zaikonn. op. cit. 45. 1966. — *D. bartlettii* Yamamoto, Suppl. Icon. Pl. Formos. 4: 16. fig. 10. 1928. — *D. pulchra* Vidal var. *hayatai* (Nakai) Zaikonn. op. cit. 46. fig. 9 (5): 1966. — *D. hayatai* Nakai op. cit. 35. 83. 1921; Engl. l. c., Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed. 2: 431. 1931; Kudo et Masamune, Ann. Rep. Bot. Gard. Taihoku Univ. 2: 114. 1932. — *D. taiwanensis* auct. non Schneid.; Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo 30: 109. 1911 et Icon. Pl. Formos. 1: tab. 33. 1911 et 2: 8. 1912; Kanehira, Formos. Trees 229. 1917; Ito, Ill. Formos. Pl. tab. 620. 1927.

灌木或小乔木，高 2—3 米；老枝褐色，近无毛，表皮片状脱落；花枝长 10—18 厘米，常具 4—6 叶，灰褐色，被星状毛。叶近革质，卵状长圆形或长圆形，长 5—12 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，先端渐尖，基部楔形或近圆形，边缘稍具圆齿或近全缘，上面绿色，疏被 6—12 辐线星状毛，下面灰白色，密被 18—22 辐线星状毛，毛被连续覆盖，侧脉每边 8—12 条，网脉两面均不明显；花枝上叶柄长 5—10 毫米，其余长 10—15 毫米，被星状毛。圆锥花序，长可达 15 厘米，直径 3—5 厘米，多花，密被星状毛；花蕾长圆形；花冠直径 1.8—2.2 厘米；花梗长约 8 毫米；萼筒杯状，高约 2.5 毫米，直径约 5 毫米，裂片三角形，长宽均约 1 毫米，与萼筒均密被 18—20 辐线星状毛；花瓣白色，长圆形或狭椭圆形，长 1—1.2 厘米，宽 3—4 毫米，先端急尖，中部以下渐狭，外面被星状毛，花蕾时覆瓦状排列；外轮雄蕊长约 10 毫米，内轮雄蕊较短，形状相同，花丝先端具 2 齿，齿平展，长不达到花药，花药长圆形，具短柄，从花丝裂齿间伸出；花柱 5，柱头稍弯，较雄蕊稍长。蒴果半球形，高约 4 毫米，直径 6—7 毫米，密被星状毛。花期 3—5 月。果期 8—9 月。

产台湾。生于海拔 300—2500 米林中。菲律宾亦产。模式标本采自菲律宾。



图版 13 1—8. 黄山溲疏 *Deutzia glauca* Cheng: 1. 花枝; 2. 叶上面示被毛; 3. 叶下面示被毛; 4. 花去花瓣示花萼和雌蕊; 5. 花瓣; 6. 外轮雄蕊; 7. 内轮雄蕊; 8. 果实。9—15. 美丽溲疏 *D. pulchra* Vidal: 9. 花枝; 10. 叶上面示被毛; 11. 叶下面示被毛; 12. 花去花瓣示花萼和雌蕊; 13. 花瓣; 14. 外轮雄蕊; 15. 内轮雄蕊。16—22. 宁波溲疏 *D. ningpoensis* Rehd.: 16. 花枝; 17. 叶上面示被毛; 18. 叶下面示被毛; 19. 花去花瓣示花萼和雌蕊; 20. 花瓣; 21. 外轮雄蕊; 22. 内轮雄蕊。(余汉平绘)