

基部圆钝，边缘有细锯齿。

16. 叶上面或沿脉被疏短毛，或无毛而有腺体，下面被密柔毛，沿脉毛更密。

17. 叶椭圆形或长圆状椭圆形，先端短尖或渐尖，侧脉 (7) 8—11 对；花序腋生
..... 15. 毛鼠刺 *I. indochinensis* Merr.

17. 叶椭圆形或长圆状卵形，先端钝或圆形，侧脉 7—8 对，下面被灰褐色短柔毛和不明
显的腺体；花序腋生兼顶生 16. 黔鼠刺 *I. quzhouensis* Cheng et Y. K. Li

16. 叶上面无毛，下面仅脉腋有短柔毛，侧脉 6—8 对

..... 15b. 毛脉鼠刺 *I. indochinensis* var. *pubinervia* (Chang) C. Y. Wu

15. 小枝纤细，无毛；叶膜质，披针形，或长圆状披针形，基部楔形，边缘具多少明显的圆齿
状齿，稀波状或全缘，两面无毛或仅下面脉腋有疏髯毛

..... 17. 小花鼠刺 *I. parviflora* Hemsl.

1. 锥花鼠刺 (云南植物志)

Itea thorelii Gagnep. Not. syst. 3: 222. 1916; Gagnep. in Lecmte, Fl. Gen. Indo
Chine 2: 687. 1920; Engler in Engl. u Prantl., Nat. Pflanzenfam. Aufl. 2, 18a: 184.
1930; Lecomte in Abbr. Fl. Camb. Laos et Vietnam 4: 40. pl. 4: 8, 9, 10. 1965;
云南植物志 1: 101, 图版 26, 图 1, 2. 3. 1977.

灌木，高 0.5—2.5 米；小枝纤细，无毛。叶薄革质，倒披针形，长 4—10 厘米，宽
(0.5) 1—3 厘米，先端渐尖，基部楔形，边缘常反卷，有疏生腺齿，两面无毛；侧脉 4—
6 对，弧状弯曲，在近缘处相连接，上面不明显，下面突起，细脉网状；叶柄长 5—10 毫
米，无毛，上面具槽沟。顶生总状圆锥花序，长 5—10 厘米；花序轴无毛或密被短柔毛；
苞片针状或线状披针形，长 2—3 毫米；花梗长 4—6 毫米，无毛或被短柔毛；萼筒倒锥
形，萼片三角状披针形，长约 2 毫米，被微柔毛；花瓣白色或淡黄绿色，长披针形，长
约 5 毫米，花期直立；雄蕊与萼片对生，长约 3 毫米；花丝无毛；花药卵圆形，背向着
生；子房半下位，无毛或多或少被短毛，心皮 2 个，仅下部紧贴；花柱中部分离，柱头
头状。蒴果锥形，长 6—7 毫米，无毛，2 心皮明显呈 90 度以上叉开。 花果期 6—10 月。

产云南麻栗坡。生于海拔 1000—1100 米的密林或开旷地。老挝、越南北部、泰国也
有分布。模式标本采自老挝琅勃拉邦。

本种在外形上与河岸鼠刺 *I. riparia* Coll. et Hemsl. 十分近似，但叶较小，倒披针
形；总状圆锥花序，与后者容易区别。

2. 河岸鼠刺 河边鼠刺 (云南植物志)

Itea riparia Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 28: 57. 1890; Engl. in
Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. Aufl. 2, 18a: 184. 1930; 云南植物志 1: 103, 图
版 26. 图 4. 5. 1977.

灌木，高 1—6 米；小枝挺直，无毛，黄绿色，具纵条纹。叶薄革质，通常在枝端密
集，近簇生，倒卵状长椭圆形、椭圆形至披针形，长 5—10 厘米，宽 1.5—3 厘米，顶端