

较宽，长不超过宽的2倍，在软骨质的边缘具疏生、硬刺状的粗锯齿。

树皮含鞣质，可制烤胶；木材坚硬，可制烟锅杆。

4. **冬青叶鼠刺** (经济植物手册) 月月青 (中国树木分类学) 图版 59: 1—3

Itea ilicifolia Oliv. in Hook. Ic. Pl. **6**: tab? 1538. 1886; Forbes. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 278. 1887; Walson, Gard. Chron. **3**: 375, tab. 152. 1903; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **2**: 395. 1905; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 44. 1913; Chung in Mém. Sci. Soc. China **1** (1): 69. 1924; Stapf in Curtis's Bot. Mag. **151**: pl. 9090. 1925; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7** (2): 437. 1931; 陈嵘, 中国树木分类学, 384. 1937; H. T. Chang in Acta Phytotax. Sin. **2** (2): 118. pl. 17. fig. 1. 1953; 经济植物手册 (上) 507. 1955; 中国高等植物图鉴 **2**: 119. 图 1967. 1972; 湖北植物志 **2**: 89. 1979.


灌木，高2—4米；小枝无毛。叶厚革质，阔椭圆形至椭圆状长圆形，稀近圆形，长5—9.5厘米，宽3—6厘米，先端锐尖或尖刺状，基部圆形或楔形，边缘具较疏而坚硬刺状锯齿，干时，常反卷，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色，两面无毛，或下面仅脉腋具簇毛；侧脉5—6对，斜上，中脉及侧脉在下面明显突起，网脉不明显；叶柄长5—10毫米，无毛。顶生总状花序，下垂，长达25—30厘米；花序轴被短柔毛；苞片钻形，长约1毫米；花多数，通常3个簇生；花梗短，长约1.5毫米，无毛；萼筒浅钟状，萼片三角状披针形，长约1毫米；花瓣黄绿色，线状披针形，长2.5毫米，顶端具硬小尖，花开放后，直立；雄蕊短于花瓣约为花瓣之半；花丝无毛，长约1.5毫米；花药长圆形；子房半下位，心皮2枚，紧贴；花柱单生，柱头头状。蒴果卵状披针形，长约5毫米，下垂，无毛。花期5—6月，果期7—11月。

产陕西南部、湖北西部 (巴东、宜昌、兴山、秭归、建始、宣恩)、四川东部 (南川、奉节、巫山、巫溪、城口、雷波)、贵州 (雍安、大定、息烽、仁怀、德江、镇宁等)。生于海拔1500—1650米的山坡、灌丛或林下、山谷、河岸和路旁。模式标本采自湖北宜昌。在英国皇家植物园邱园引种栽培，常绿，叶形奇特可供观赏。陕西为分布新记录。

5. **秀丽鼠刺** (中国植物图谱)

Itea amoena Chun in Sunyatsenia **1**: 238. 1934, et Icon. Pl. Sin. **5**: 19., t. 219. 1937; Metcalf. in Journ. Arn. Arb. **26**: 199. 1945; H. T. Chang in Acta Phytotax. Sin. **2** (2): 119. Pl. 18. f. 10. 1953. — *I. riparia* Hemsl. var. *acuminata* Hu in shed. — *I. lanceolata* Merr. in shed.

常绿小灌木，高1.5—2米；全株无毛，或仅花序稍被短毛。花枝细长，黄绿色，具纵条纹；果枝深褐色。叶薄革质，狭长披针形，长5—11厘米，宽1.2—2厘米，先端渐尖或长渐尖，基部楔形或稍钝，边缘干时略反卷，上半部边缘有4—8个圆齿状腺齿，中部以下全缘，上面亮绿色，中脉下陷，侧脉6—8对，弧状上升，细脉密集连结或网状，



图版 59 1—3. 冬青叶鼠刺 *Itea ilicifolia* Oliv. : 1. 花枝; 2. 果枝; 3. 花; 4. 果实。5—7.

滇鼠刺 *Itea yunnanensis* Franch. : 5. 花枝; 6. 花; 7. 果实。(张泰利绘)