

较大，长 5—7 毫米。

产四川（西部）、云南（东北部、西北部）。生于山坡阴处灌丛中或沟边杂木林下，海拔 1100—3400 米。模式标本采自四川西部。

据原始记载，本变种叶下无毛，稀具短柔毛。经观察四川和云南地区标本后，发现叶下常被短柔毛，其它特征均似腺毛茶藨子，故把这类有毛类群均作西南茶藨子处理。

11d. **毛长串茶藨子**（变种）（广西植物）

var. **pilosum** Ku in Guihaia **9** (4): 288. 1989.

与原变种区别在于，叶两面、叶柄、花萼和果实均被短柔毛。

产云南西北部。生于山坡针叶林下，海拔 2800 米。模式标本采自贡山。

系 2. 直萼系 Ser. Meyeriana Pojark. in Acta Inst. Bot. Acad. Sci. USSR **1**, **2**: 175. 1936, emend. L. T. Lu in Acta Phytotax. Sin. **33** (1): 65. 1995. —Ser. *Petraea* Pojark. op. cit. 176. p. p. et in Kom. Fl. USSR **9**: 242. 1939 “Ser. *Petraeae*”. p. p.

直立灌木；萼筒钟形至钟状短圆筒形；萼片直立，边缘具睫毛。

本系的选模式种：天山茶藨子 *R. meyeri* Maxim.

本系有下列 3 种。

12. **糖茶藨子**（秦岭植物志） 埃牟茶藨子（华北经济植物志要），喜马拉雅茶藨子（拉汉种子植物名称）

Ribes himalense Royle ex Decne. in Jacquem. Voy. Inde **4** (Bot.): 66. tab. 77. 1844 “*himalayense*”; Jancz. in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève **35**, **3**: 296. fig. 32. 33. 1907 “*Himalayense*”; Hara in Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal **2**: 158. 1979. —*R. glaciale* Wall. Cat. 229. no. 6833. 1832. p. p. —*R. meyeri* Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**: 403. 1905. p. p., non Maxim. 1874. —*R. himalayense* var. *decaisnei* Jancz. et var. *urceolatum* Jancz. op. cit. 297. —*R. emodense* Rehd. in Journ. Arn. Arb. **5**: 161. 1924; Berger, Taxon. Rev. Curr. Gooseb. **19**. 1924; Hara, Fl. E. Himal. **2**: 48. 1971; 秦岭植物志 **1** (2): 451. 1974; 中国树木志 **2**: 1580. 1985. —*R. emodense* var. *urceolatum* (Jancz.) Rehd. l. c. —*R. rubrum* auct. non Linn. 1753; Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. **2**: 89. 1857. p. p.; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**: 411. 1878.

12a. **糖茶藨子**（原变种）

var. **himalense**

落叶小灌木，高 1—2 米；枝粗壮，小枝黑紫色或暗紫色，皮长条状或长片状剥落，嫩枝紫红色或褐红色，无毛，无刺；芽小，卵圆形或长圆形，长 3—5 毫米，宽 1—2.5 毫