

皮孔,干后灰褐色;芽体有褐色柔毛。叶薄革质,倒披针形或矩圆状倒披针形,长3—5厘米,宽1—1.5厘米,先端锐尖,基部狭窄下延;上面绿色,干后暗晦无光泽,下面秃净无毛,干后稍带褐色;侧脉4—6对,在上面不明显,在下面略突起,网脉在两面均不显著;边缘无锯齿,仅在最尖端有由中肋突出的小尖突;叶柄极短,长不到1毫米,无毛;托叶短小,早落。雌花或两性花的穗状花序腋生,长1—3厘米,花序轴有毛,苞片线状披针形,长2—3毫米;萼筒极短,萼齿披针形,长2毫米;雄蕊未见;子房有星毛,花柱长5—6毫米。蒴果卵圆形,长7—8毫米,有褐色星状绒毛,先端尖锐,宿存花柱长1—2毫米。种子褐色,长4—5毫米,发亮。

分布于四川、湖北、湖南、福建、广东及广西等省区。常生于山溪旁或河边。

嫩枝纤细,稍压扁,秃净无毛,节间稍伸长,长约1—2.5厘米,叶倒披针形,先端锐尖,基部狭窄而下延,全缘,仅在最先端有1个小尖突,叶脉不明显,叶柄极短。

11a. 圆头蚊母树

Distylium buxifolium Merr. var. *rotundum* Chang, 中山大学学报, 1960, 第1期40页。

常绿灌木,嫩枝有褐色柔毛。叶倒卵状矩圆形,长2—4.5厘米,宽1—1.8厘米,先端圆形或钝,中肋突出成1个小尖突,基部楔形,下面无毛,侧脉不明显,全缘,或近先端每侧各有1个小齿突,叶柄长2—3毫米。蒴果长8—9毫米,有褐色星状绒毛。

分布于浙江、福建及广东。

和原种的区别在于嫩枝有毛,叶倒卵状矩圆形,先端圆或钝,全缘或每侧各有1个小齿突,侧脉不明显,叶柄稍长。

12. 台湾蚊母树

Distylium gracile Nakai in Journ. Arn. Arb. 5: 77, 1924; Kanehira Form. Trees, rev. ed. 253, f. 199, 1936; Walker, l. c.

常绿小乔木,高达10米;嫩枝纤细,有褐色星状柔毛,老枝秃净无毛,有皮孔,芽体有褐色星状绒毛。叶广椭圆形,长2—3厘米,宽7—20毫米;先端钝,有由中肋突出的小尖突,基部广楔形;上面深绿色,无毛,稍暗晦,下面秃净无毛;侧脉3—4对,在上面不明显,在下面略突起,全缘,或靠近先端每边各有1—2个小齿突;叶柄长2—4毫米,有星状柔毛。花未见。果序总状,腋生,长1.5—3厘米,有蒴果1—3个。蒴果卵圆形,长约1厘米,被星毛,宿存花柱极短。

分布于我国台湾省及浙江普陀。

嫩枝有毛,叶广椭圆形,长2—3厘米,最宽达2厘米,先端有1—2个小齿突,它和中华蚊母树 *D. chinense* 非常接近,只是后者叶片矩圆形,宽不过1厘米,先端较尖,叶柄较短。