

毛,叶片中部以上有钝齿,下面具短柔毛,叶柄很短,易于区分。

组 3. 长伞花序组 Sect. Chamaedryon Ser. in DC. Prodr. 2:542. 1825.——*Spiraea* subgen. *Metaspiraea* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 4:12. 1916.——*Spiraea* sect. *Metachamaedryon* Nakai, l. c. 23. 1916.

本组有下列 4 系。

系 1. 三裂系 Ser. Trilobatae Pojark. in Fl. URSS 9:299. 1939. emend. Yü, 植物分类学报 8:214. 1963.

本系有下列 16 种:

24. 麻叶绣线菊 麻叶绣球(汝南圃史),粤绣线菊(经济植物手册),麻毡(花镜),麻叶绣球绣线菊(东北植物检索表),石棒子(河南土名)

*Spiraea cantoniensis* Lour. Fl. Cochinch. 1:322. 1790; Benth. Fl. Hongk. 105. 1861; Maxim. in Acta Hort. Petrop. 6:195. 1879; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 5:170. 1924 & 8:117. 1927; 陈嵘,中国树木分类学 487. 图 382. 1937; 侯宽昭等,广州植物志 292. 1956; 裴鉴等,江苏南部种子植物手册 373. 图 602. 1959; 中国高等植物图鉴 2:175. 图 2080. 1972.——*S. reevesiana* Lindl. in Bot. Reg. 30: t. 10. 1844.

麻叶绣线菊(原变种) 图版 4:16—17

*S. cantoniensis* Lour. var. *cantoniensis*

灌木,高达 1.5 米;小枝细瘦,圆柱形,呈拱形弯曲,幼时暗红褐色,无毛;冬芽小,卵形,先端尖,无毛,有数枚外露鳞片。叶片菱状披针形至菱状长圆形,长 3—5 厘米,宽 1.5—2 厘米,先端急尖,基部楔形,边缘自近中部以上有缺刻状锯齿,上面深绿色,下面灰蓝色,两面无毛,有羽状叶脉;叶柄长 4—7 毫米,无毛。伞形花序具多数花朵;花梗长 8—14 毫米,无毛;苞片线形,无毛;花直径 5—7 毫米;萼筒钟状,外面无毛,内面被短柔毛;萼片三角形或卵状三角形,先端急尖或短渐尖,内面微被短柔毛;花瓣近圆形或倒卵形,先端微凹或圆钝,长与宽各约 2.5—4 毫米,白色;雄蕊 20—28,稍短于花瓣或几与花瓣等长;花盘由大小不等的近圆形裂片组成,裂片先端有时微凹,排列成圆环形;子房近无毛,花柱短于雄蕊。蓇葖果直立开张,无毛,花柱顶生,常倾斜开展,具直立开张萼片。花期 4—5 月,果期 7—9 月。

产广东、广西、福建、浙江、江西。在河北、河南、山东、陕西、安徽、江苏、四川均有