

- 米, 2—3 小核。…………… 25. 少花构子 *C. oliganthus* Pojark.
 86. 叶片宽卵形至近圆形, 先端圆钝稀急尖; 果长圆形, 3 小核。……………
 …………… 29. 恩施构子 *C. fangianus* Yü
 81. 叶片先端多急尖, 少圆钝。
 88. 叶片下面被白色绒毛。
 89. 叶片卵形至长圆卵形; 果倒卵形, 红色, 2 小核。……………
 …………… 26. 细弱构子 *C. gracilis* Rehd. & Wils.
 89. 叶片卵形至狭椭圆卵形; 果卵形, 黑色, 1—2 小核。……………
 …………… 30. 细枝构子 *C. tenuipes* Rehd. & Wils.
 88. 叶片下面被灰色或黄色绒毛。
 90. 叶片椭圆形至卵形, 长 1.5—3.5 厘米; 果红色, 2 小核连合为一。……………
 …………… 15. 华中构子 *C. silvestrii* Pamp.
 90. 叶片椭圆形至卵形, 长 1—2.5 厘米; 果红色, 3—5 小核。……………
 …………… 31. 木帚构子 *C. dielsianus* Pritz.

组 1. 密花组 Sect. *Densiflos* Yü, 植物分类学报 8:217. 1963. —Sect. *Chaenopetalum* Koehne, Deuts. Dendr. 226. 1893. p. p.

本组有下列 2 系。

系 1. 柳叶系 Ser. *Salicifolii* Yü, 植物分类学报 8:217. 1963.

本系有下列 5 种:

1. 柳叶构子(经济植物手册) 山米麻、木帚子(四川土名)

Cotoneaster salicifolius Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris sér. 2. 8:225. 1885; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:759. 1906; Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:172. 1912; Stapf in Curtis's Bot. Mag. 149: t. 8999. 1923; 陈嵘, 中国树木分类学 438. 1937; Klötz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 6:971. 1957; 中国高等植物图鉴 2:190. 图 2110. 1972. —*C. salicifolia* var. *floccosa* Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:173. 1912.

柳叶构子(原变种) 图版 18:14—17

C. salicifolius Franch. var. ***salicifolius***

半常绿或常绿灌木, 高达 5 米; 枝条开张, 小枝灰褐色, 一年生枝红褐色, 嫩时被绒毛, 老时脱落。叶片椭圆长圆形至卵状披针形, 长 4—8.5 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 先端急尖或渐尖, 基部楔形, 全缘, 上面无毛, 侧脉 12—16 对下陷, 具浅皱纹, 下面被