

产四川、云南。生于杂木林中及林缘，海拔 1500—2000 米。模式标本采自云南瑞丽江河谷。

此种和尖叶栒子 *C. acuminatus* Lindl. 相近，主要异点为后者叶片多椭圆卵形，上面多被柔毛，果实较大，椭圆形，长 8—10 毫米，直径 7—8 毫米。

19. 泡叶栒子(经济植物手册)

Cotoneaster bullatus Bois in Vilm. & Bois, Frutic. Vilm. 119. 2. f. 1904 & in Fedde, Repert. Sp. Nov. 3:228. 2. f. 1906; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:747. 1906; Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:133. 1954; Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 6:951. 1957; 中国高等植物图鉴 2:194. 图 2118. 1972.——*C. moupinensis* auct. non Franch. 1888; Stapf in Curtis's Bot. Mag. 135: t. 8284. 1909.

泡叶栒子(原变种) 图版 22:10—15

C. bullatus Bois var. **bullatus**

落叶开张灌木，高达 2 米；小枝粗壮，圆柱形，稍弯曲，灰黑色，幼嫩时被糙伏毛。叶片长圆卵形或椭圆卵形，长 3.5—7 厘米，宽 2—4 厘米，先端渐尖，有时急尖，基部楔形或圆形，全缘，上面有明显皱纹并呈泡状隆起，无毛或微具柔毛，下面具疏生柔毛，沿叶脉毛较密，有时近无毛；叶柄长 3—6 毫米，具柔毛；托叶披针形，有柔毛，早落。花 5—13 朵成聚伞花序，总花梗和花梗均具柔毛；花梗长 1—3 毫米；花直径 7—8 毫米；萼筒钟状，外面无毛或具稀疏柔毛，内面无毛；萼片三角形，先端急尖，外面无毛或有稀疏柔毛，内面仅先端具柔毛；花瓣直立，倒卵形，长约 4.5 毫米，先端圆钝，浅红色；雄蕊约 20—22，比花瓣短；花柱 4—5，离生，甚短；子房顶端具柔毛。果实球形或倒卵形，长 6—8 毫米，直径 6—8 毫米，红色，4—5 小核。花期 5—6 月，果期 8—9 月。

产湖北、四川、云南、西藏。生于坡地疏林内、河岸旁或山沟边，海拔 2000—3200 米。

本种近似尖叶栒子 *C. acuminatus* Lindl.，唯后者叶片上面柔毛较多，不具泡状隆起，萼筒外具柔毛，果实椭圆形，常具 2 小核，可以区分。

泡叶栒子大叶变种

C. bullatus Bois var. **macrophyllus** Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:164. 1912; Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 6:951. 1957.——*C. rehderi* Pojark. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. URSS 17:184. 1955.

本变种与原变种的异点为植株高达 5 米；叶片宽大，长 5—15 厘米，宽 2.5—8 厘