

O. schwerinae Schneid. var. **microphylla** Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 3:431. 1917.—*O. schwerinae* γ. *multijuga* Koidz. Fl. Symb. Orient.-Asiat. 52. 1936.

本变种与原变种区别在于叶片及叶柄均近于无毛,小叶片细小,长3—5毫米。

产陕西、甘肃、四川、云南。生山坡、路旁、松林边及灌木丛中,海拔1500—2700米。模式标本采自四川茂汶。

3. 圆叶小石积 小石积(经济植物手册)

Osteomeles subrotunda K. Koch in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1:250. 1864; Hemsl. in Hook. Ic. Pl. 27: t. 2644. 1900.—*Osteomeles anthyllidifolia* var. *subrotunda* Masum in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gand. 2:124. 1932.—*Osteomeles anthyllidifolia* f. *subrotunda* (K. Koch) Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 23:169. 1909 & in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 34(2):44. 1913.

常绿灌木,高约2米,枝条密集;小枝细弱,圆柱形,幼嫩时密被灰白色长柔毛,逐渐脱落,多年生枝条灰褐色,无毛;冬芽小,卵形,紫褐色。奇数羽状复叶,革质,小叶片5—8对,稀15对,连叶柄长2—3.5厘米;小叶片对生,相距约2毫米,近圆形或倒卵状长圆形,长4—6毫米,宽2—3毫米,先端圆钝或有短尖头,基部圆形或近圆形,全缘,上面有光泽,散生长柔毛,下面密被灰白色丝状长柔毛;小叶柄极短或近于无柄,叶轴上有窄叶翼,叶柄长3—7毫米,被柔毛;托叶披针形,被柔毛,早落。顶生伞房花序,多花,直径2—3.5厘米;总花梗和花梗均被长柔毛,花梗长约6毫米;苞片披针形,早落;花直径约1厘米;萼筒钟状,外面被柔毛;萼片三角披针形,先端急尖,全缘,约与萼筒等长,外被柔毛,内面近于无毛;花瓣近圆形,白色;雄蕊20,比花瓣稍短;花柱5,基部无毛,柱头头状,约与雄蕊等长。果实近球形,直径6—12毫米,萼片宿存。花期4—6月。果期7—9月。

产广东(仁化)。生路旁混交林边,海拔200—500米。分布日本琉球和小笠原群岛及菲律宾群岛。

本种近似华西小石积 *O. schwerinae* Schneid., 惟后者叶片多椭圆形或长圆形,先端急尖,萼筒外面近于无毛,花柱基部被柔毛,易于区别。

圆叶小石积无毛变种

O. subrotunda K. Koch var. **glabrata** Yü, var. nov.

本变种与原变种区别在于叶片及叶柄均无毛或近于无毛,小叶片较小,先端钝头并有短尖,长3—4毫米,宽1.5—2毫米。