

毛。果实扁球形,直径约8毫米,桔黄色,外被柔毛;萼片宿存,向内闭合。

分布印度、尼泊尔、老挝、缅甸。生杂木林中,海拔1000—2800米。

本种与我国西南各地习见的红果树 *S. davidiana* Dcne. 的异点,在于后者叶片全缘,果实红色。

### 3. 滇南红果树

***Stranvaesia oblanceolata*** (Rehd. & Wils.) Stapf in Curtis's Bot. Mag. **149**: sub t. 9008. 1924.——*Stranvaesia nussia* var. *oblanceolata* Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. **1**:193. 1912; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:483. 1933; Vidal in Adansonia **5**:232. 1965 & in Fl. Camb. Laos et Vietn. **6**:56. pl. 8. 1968 & in Fl. Thailand **2**(1):42. 1970.

灌木高达5—9米;小枝粗壮,圆柱形,无毛,当年生枝紫红色,老枝暗紫褐色,散生圆形皮孔;冬芽长卵形,紫褐色,无毛。叶片革质,有光泽,倒披针形或倒卵状长圆形,长8—13厘米,宽3.5—5厘米,先端急尖,基部楔形,稀近圆形,边缘有不显明圆钝锯齿,两面无毛,上面中脉稍下陷,下面中脉显著突起;叶柄长1.5—4厘米,无毛。复伞房花序,直径5—10厘米,密具多花;花梗长3—5毫米,总花梗和花梗均无毛;苞片早落;花直径约1厘米;萼筒钟状,外面无毛;萼片三角卵形,长约2毫米,比萼筒约短三分之二,先端急尖,全缘,无毛;花瓣近圆形,白色;雄蕊20;花柱5,大部分合生成束,柱头头状;子房外被柔毛,基部与花托连合。果实卵形,直径6—8毫米;萼片宿存,直立。花期4月,果期6月。

产云南南部。生于山坡或山谷常绿混交林中,海拔1400—2000米。模式标本采自思茅。泰国、缅甸和老挝也有分布。

本种与红果树 *S. davidiana* Dcne. 的异点,在其叶边有不显明的圆钝锯齿和花序全部无毛。又与印緬红果树 *S. nussia* (Buch.-Ham.) Dcne. 是近缘种,但后者叶柄较短,花萼、花梗和总花梗均被柔毛,易于识别。

### 4. 毛萼红果树

***Stranvaesia amphidoxa*** Schneid. in Bull. Herb. Boiss. sér. 2. **6**:319. 1906 & Ill. Handb. Laubh. **1**:713. f. 394 k-i. 1906.——*Photinia amphidoxa* (Schneid.) Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. **1**:190. 1912; Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris **26**:568. 1920; Chun in Sunyatsenia **2**:65. 1924; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:306. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:481. 1933; Metcalf in Journ. Arn. Arb. **20**: 441. 1939.——*Pirus feddei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **12**:189. 1913 & Fl. Kouy-Tchéou