

色,内面有柔毛;雄蕊 20,排成二层,外层雄蕊与花瓣等长,内层短于花瓣;花柱 3—4,基部合生,无毛。果实卵形,直径 5—10 毫米,常不具斑点,萼片脱落后先端留有圆穴。花期 3—5 月,果期 10 月。

产云南西北部。生于溪旁杂密林中或阴坡岩石山上,海拔 1500—2700 米。模式标本采自茨柯。

此种和褐毛花楸 *S. ochracea* (Hand.-Mazz.) Vidal 相似,区别仅在于后者叶片较大,多卵形,侧脉 10—12 对,叶柄较长,花序和果实均较大。又与滇缅花楸 *S. thomsonii* (King) Rehd. 比较,后者叶片两面、叶柄和花序均不具锈褐色毛,侧脉 7—10 对,易于区别。

23. 锈色花楸

Sorbus ferruginea (Wenzig) Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2:277. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:467. 1933.——*Sorbus sikkimensis* Wenzig *δ. ferruginea* Wenzig in Linnaea 38:60. 1874.——*Pyrus ferruginea* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:379. 1878; Brandis, Ind. Trees 292. 1906.——*Micromeles ferruginea* Koehne, Gatt. Pomac. 21. 1890; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:700. 1906.

乔木或灌木,高 4—10 米;小枝肥壮,幼时密被锈色绒毛,以后逐渐脱落,二年生枝灰褐色,具多数显明皮孔;冬芽卵形,先端圆钝,外被多数棕褐色鳞片,光滑无毛。叶片卵形、椭圆形或倒卵形,长 5—8 (10) 厘米,宽 3—4.5 厘米,先端短渐尖或急尖,基部宽楔形或圆形,边缘全部有细锐锯齿或仅基部近全缘,幼时上下两面密被锈色绒毛,老时脱落,仅在下面中脉及侧脉上具锈色绒毛,侧脉 6—8 (11) 对,直达叶边齿尖,在下面显著突起;叶柄长 1—1.5 厘米,幼时密被锈色绒毛,老时脱落,无毛或近于无毛。复伞房花序多花,总花梗和花梗有锈色绒毛;花梗长 3—5 毫米;花直径 7—9 毫米;萼筒钟状,外面有锈色绒毛,内面无毛;萼片三角卵形,先端钝,外面有锈色绒毛,内面无毛;花瓣宽长圆形或卵形,长 3—4 毫米,宽约 3 毫米,先端圆钝,白色,内面有稀疏柔毛;雄蕊 20,稍长于花瓣;花柱 3—4,基部或近中部合生,无毛,短于雄蕊。果实球形,直径 5—8 毫米,平滑或有极少数斑点,萼片脱落后先端留有圆痕。花期 4 月,果期 9—10 月。

产云南中部和西部。生于山谷斜坡、石山或丛林内,海拔 2300—2500 米。锡金、不丹也有分布。

24. 附生花楸 图版 42:7—9

Sorbus epidendron Hand.-Mazz. in Anzeig. Akad. Wiss. Wien. Math.-Naturw.