

1911 et Bibl. Bot. **83**: 45. 1914. — *R. chinensis* Franch. Pl. Delav. 207. 1890, non Ser. 1825.

灌木,高1—2米;老枝紫褐色,无毛,幼时具柔毛,有针刺并混生疏腺毛。小叶常5—7枚,卵形或卵状披针形,长4—8厘米,宽2—6厘米,顶端急尖至渐尖,基部圆形,顶生小叶基部常近截形,上面具稀疏短柔毛,下面密被灰白色绒毛,边缘不规则羽状浅裂,具缺刻状尖锐重锯齿;叶柄长4—8厘米,顶生小叶柄长1.5—3厘米,侧生小叶近无柄,与叶轴均被柔毛、针刺或混生疏腺毛;托叶披针形或线状披针形,具柔毛或稀疏腺毛。花2—3朵顶生或单花生于叶腋;花梗长1—2.5厘米,具柔毛、针刺或稀疏腺毛;苞片线形,具柔毛;花较大,直径在1厘米以上;花萼外面被柔毛和针刺或疏生腺毛;萼片卵状披针形,长达2厘米,外面边缘具灰白色绒毛,顶端尾尖,在花果时均直立开展;花瓣倒卵形或近圆形,基部有柔毛和短爪,浅红色或白色带红色,比萼片短得多;花丝紫红色,短于花柱;花柱和子房均无毛,稀疏生柔毛。果实近球形,直径达1—1.5厘米,红色,无毛;核有浅皱纹或浅窝孔。花期6—7月,果期8—9月。

产云南西北部、西藏。生于山地针叶林下或灌丛中,海拔2000—4100米。

30. 茅莓(本草纲目) 红梅消(植物名实图考),藕田蔗(本草纲目),小叶悬钩子(华北经济植物志要),茅莓悬钩子(东北木本植物图志),草杨梅子(湖北),蛇泡簕(岭南采药录),牙鹰簕(广州),婆婆头(东北)

Rubus parvifolius L. Sp. Pl. 1197. 1753 exclud. syn. ed. 2. 207. 1762. p. p.; Merr. in Trans. Am. Philos. Soc. n. ser. **24**: 181 (Comm. Lour. Fl. Cochinch.) 1935; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **18**: 47. 1947; 江苏南部种子植物手册 364. 图 586. 1959; 中国高等植物图鉴 **2**: 279. 图 2288. 1972; Li, Woody Fl. Taiwan 315. 1963; Ohwi, Fl. Jap. 536. 1965; Liu et Su in Fl. Taiwan **3**: 119. 1977. — *R. triphyllus* Thunb. in Fl. Jap. 215. 1874; Focke in Engler, Bot. Jahrb. **29**: 396. 1900 et Bibl. Bot. **72**(2): 187. 1911; Nakai in Fl. Sylv. Kor. **7**: 73. t. 31. 1918; Card. in Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 647. 1920; Thuan. in Fl. Camb. Laos et Vietn. **7**: 29. 1968. — *R. triphyllus* Thunb. var. *subconcolor* Card. in Lecomte, Not. Syst. **3**: 311. 1914. — *R. parvifolius* L. var. *triphyllus* (Thunb.) Nakai, Veg. Mt. Apoi 11. 1930. — *R. triphyllus* Thunb. var. *concolor* Makino & Nemoto subvar. *subconcolor* Masamune ex Kudo & Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard. **3**: 130. 1932. — *R. parvifolius* L. var. *subconcolor* (Card.) Makino & Nemoto in Fl. Jap. ed. 2. 520. 1936.

30a. 茅莓(原变种)

R. parvifolius L. var. **parvifolius**

灌木,高1—2米;枝呈弓形弯曲,被柔毛和稀疏钩状皮刺;小叶3枚,在新枝上偶有5枚,菱状圆形或倒卵形,长2.5—6厘米,宽2—6厘米,顶端圆钝或急尖,基部圆形或宽楔