

萼片披针形,顶端尾尖;花瓣卵状长圆形或长圆形,白色,几与萼片等长,顶端圆钝或近急尖;雄蕊多数,花丝宽扁;雌蕊多数,子房无毛。果实卵球形,直径约1厘米,红色,无毛;核具皱纹。花期3—4(5)月,果期5—6月。

产浙江、福建。生低海拔至中海拔的山坡、山脚、沟边及杂木林下。

80. **三花悬钩子**(中国高等植物图鉴) 三花莓(经济植物手册), 苦悬钩子(台湾木本植物志)

Rubus trianthus Focke, *Bibl. Bot.* **72**(2):140. f. 59. 1911; *Hand.-Mazz. Symb. Sin.* **7**:498. 1933; Thuan in *Fl. Camb. Laos et Vietn.* **7**:18. 1968; 中国高等植物图鉴 **2**: 273. 图 2275. 1972. — *R. conduplicatus* Duthie ex Hayata in *Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo* **30**(1):89. 1911 (*Mat. Fl. Formos.*); *Icon. Pl. Formos.* **1**:224. f. 24. 1911 et **7**: 15. f. 10a—á. 1918. — *R. retusipetalus* Hayata in *Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo* **30**(1): 94. 1911. — *R. incisus* Thunb. var. *conduplicatus* (Duthie ex Hayata) Koidz. in *Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo* **34**(2):122. 1913. — *R. incisus* sensu Koidz. in *Journ. Coll. Sci. Univ. Kokyo* **34**(2):121. 1913. p. p. non Thunb. 1784. — *R. koehneanus* Focke var. *formosanus* Card. in *Lecomte, Not. Syst.* **3**:306. 1914. — *R. incisus* Thunb. subsp. *koehneanus* (Focke) Koidz. var. *formosanus* Masamune ex Kudo & Masamune in *Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard.* **2**:130. 1932.

藤状灌木,高0.5—2米。枝细瘦,暗紫色,无毛,疏生皮刺,有时具白粉。单叶,卵状披针形或长圆披针形,长4—9厘米,宽2—5厘米,顶端渐尖,基部心脏形,稀近截形,两面无毛,上面色较浅,3裂或不裂,通常不育枝上的叶较大而3裂,顶生裂片卵状披针形,边缘有不规则或缺刻状锯齿;叶柄长1—3(4)厘米,无毛,疏生小皮刺,基部有3脉;托叶披针形或线形,无毛。花常3朵,有时花超过3朵而成短总状花序,常顶生;花梗长1—2.5厘米,无毛;苞片披针形或线形;花直径1—1.7厘米;花萼外面无毛;萼片三角形,顶端长尾尖;花瓣长圆形或椭圆形,白色,几与萼片等长;雄蕊多数,花丝宽扁;雌蕊约10—50,子房无毛。果实近球形,直径约1厘米,红色,无毛;核具皱纹。花期4—5月,果期5—6月。

产江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏、福建、台湾、四川、云南、贵州。生山坡杂木林或草丛中,也习见于路旁、溪边及山谷等处,海拔500—2800米。越南有分布。

全株入药,有活血散瘀之效。

81. **中南悬钩子** 山莓(江西)

Rubus grayanus Maxim. in *Bull. Acad. Sci. St., Petersb.* **7**:152. 1872; Forbes et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* **23**:231. 1887; Focke, *Bibl. Bot.* **72**(2):142. 1911; Ohwi, *Fl. Jap.* 533. 1965.

81a. **中南悬钩子**(原变种) 图版 13: 6—7

R. grayanus Maxim. var. **grayanus**