

95d. 腺毛高粱泡(变种)(拉汉种子植物名称)

R. lambertianus Ser. var. **glandulosus** Card. in Lecomte, Not. Syst. **3**:293. 1914.
 ——*R. lambertianus* Ser. var. *minimiflours* (Lévl.) Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris
23:281. 1917. ——*R. adenothyrsus* Card. in Lecomte, Not. Syst. **3**:292. 1914. ——*R.*
minimiflorus Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **4**:332. 1907 et in Bull. Acad. Géog. Bot.
20 (Mém.): 32. 1909; Focke, Bibl. Bot. **72**(1):56. 1910 et **83**:28. 1914. ——*R. lamber-*
tianus Ser. var. *mekongensis* Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:490. 1933. syn. nov.

本变种枝、叶片两面均无毛或仅于叶片上面沿叶脉稍具柔毛;花序无毛或近无毛,近似光滑高粱泡 *R. lambertianus* Ser. var. *glaber* Hemsl., 区别仅在于本变种花序各部分或局部或花萼上具疏密不等的小腺毛。

产湖北、四川、云南、贵州。生山谷疏林或灌木丛中潮湿处,海拔可达 2000 米以上。

R. morii Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **30**(1): 90. 1911 (Mat. Fl. Formos.) ——*R. gelatinosus* Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **21**:249. 1931. ——*R. tiponensis* Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **23**:93. 1933.

产我国台湾东部高海拔地区。

此种和腺毛高粱泡十分相近,区别仅在于幼时植株全体具暗紫红色腺毛或腺点。两者可能是同物异名,因未见标本,待以后考订。

亚组 17. 长叶亚组——Subsect. *Dolichophylli* Yü et Lu, 植物分类学报 **20**(3): 309. 1982. ——Sect. *Elongati* Focke, Bibl. Bot. **72**(1):49. 1910 et **83**: 24. 1914. p. p. ——Sect. *Pirifolii* Focke, l. c. **72**(1):63. 1910 et **83**: 27. 1914. p. p.

本亚组有下列 10 种。

96. 长叶悬钩子(广西植物名录)

Rubus dolichophyllus Hand.-Mazz. in Sinensia **3**(8): 186. 1933. ——*R. chingianus* Hand.-Mazz. in Sinensia **2**(10): 124. 1932, non *R. chingii* Hu in Journ. Arn. Arb. **7**: 70. 1926 = *R. chungii* Hu in l. c. **6**: 141. 1925. sphalm.

96a. 长叶悬钩子(原变种)

R. dolichophyllus Hand.-Mazz. var. **dolichophyllus**

藤状灌木,高达 7 米;枝褐色或紫褐色,无毛,具白粉,具稀疏钩状小皮刺。单叶,近革质,披针形,长 7—16 厘米,宽 1.5—3 厘米,顶端长渐尖,基部圆形至浅心形,上面无毛,下面密被灰白色绒毛,沿叶脉常无毛,边缘有浅锐细锯齿,叶脉 8—11 对,在上面下陷,下面突起;叶柄长 5—7 毫米,上面稍有柔毛;托叶离生,上半部掌状分裂,裂片披针形,无毛。花成大型圆锥花序,顶生或腋生,长达 20 厘米;总花梗和花梗无毛;花梗长约 1 厘米,具稀疏腺毛;苞片比托叶狭小,顶端掌状分裂,裂片线形或近钻形;花直径不到 1 厘米;花萼紫红色,外被灰白色绒毛和疏腺毛;萼片披针形,顶端钻状长渐尖,全缘,在果期常反折;无花