

产广东、广西。生山坡石上阳处林中或山谷疏林中,海拔 900—1500 米。

本种叶片近圆形,下面无毛;花成顶生狭圆锥花序或腋生近总状花序;托叶宽,长圆形,长 2—3 厘米,这些特征易与其他种相区别。

亚组 22. 总序亚组——Subsect. *Sozostyli* (Focke) Yü et Lu, 植物分类学报 **20** (4): 461. 1982. ——Sect. *Sozostyli* Focke, Bibl. Bot. **72**(1):42. 1910 et **83**:22. 1914.

本亚组有下列 17 种。

151. **五叶鸡爪茶**(湖北植物志) 五加皮(四川),普莱肥莓(经济植物手册)

Rubus playfairianus Hemsl. (in sched. ex pte. nom. mutat.) ex Focke, Bibl. Bot. **72** (1):45. 1910. ——*R. playfairii* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:235. 1887. ex pte.

落叶或半常绿攀缘或蔓性灌木;枝暗色,幼时有绒毛,疏生钩状小皮刺。掌状复叶具 3—5 枚小叶,小叶片椭圆披针形或长圆披针形,长 5—12 厘米,宽 1—3 厘米,顶生小叶远较侧生小叶大,顶端渐尖,基部楔形,上面无毛,下面密被平贴灰色或黄灰色绒毛,边缘有不整齐尖锐锯齿,侧生小叶片有时在近基部 2 裂;叶柄长 2—4 厘米,被绒毛状柔毛,疏生钩状小皮刺,顶生小叶有极短柄,侧生小叶几无柄;托叶离生,长达 1 厘米,长圆形,掌状深裂,裂片披针形或线形,脱落。花成顶生或腋生总状花序;总花梗和花梗被灰色或灰黄色绒毛状长柔毛,混生少数小皮刺;花梗长 1—2 厘米;苞片与托叶相似;花直径 1—1.5 厘米;花萼外密被黄灰色至灰白色绒毛状长柔毛,无腺毛;萼片卵状披针形或三角状披针形,顶端渐尖至尾尖,全缘;花瓣卵圆形,锐尖;雄蕊多数,幼时有柔毛,老时脱落,花丝不膨大;雌蕊约 60,具长柔毛。果实近球形,幼时红色,有长柔毛,老时转变为黑色,由多数小核果组成。花期 4—5 月,果期 6—7 月。

产陕西、湖北、四川、贵州。生山坡路旁、溪边及灌木丛中,海拔 300—1700 米。

根含丹宁,可提取栲胶。

此种和竹叶鸡爪茶 *R. bambusarum* Focke 区别在于后者托叶和苞片全缘或仅顶端有锯齿;小叶片狭披针形或狭椭圆形,边缘有不明显的稀疏小锯齿;雄蕊柔毛老时不脱落。

152. **竹叶鸡爪茶**(湖北植物志) 老林茶(湖北),短柄鸡爪茶(中国树木分类学)

Rubus bambusarum Focke in Hook. Icon. Pl. ser. **3**:10; in nota ad pl. 1952. 1891; Focke, Bibl. Bot. **72**(1):44. 1910. ——*R. henryi* Hemsl. et Ktze. var. *bambusarum* (Focke) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **2**:179. 1921; Sealy in Curtis's Bot. Mag. **165**:t. 33. 1948; 中国高等植物图鉴 **2**: 261. 1972.

常绿攀援灌木;枝具微弯小皮刺,幼时被绒毛状柔毛,老时无毛。掌状复叶具 3 或 5 小叶,革质,小叶片狭披针形或狭椭圆形,长 7—13 厘米,宽 1—3 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形,上面无毛,下面密被灰白色或黄灰色绒毛,中脉突起而呈棕色,边缘有不明显的稀疏小锯齿;叶柄长 2.5—5.5 厘米,幼时具绒毛,逐渐脱落至无毛,小叶几无柄;托叶早落。花成

顶生和腋生总状花序，总花梗和花梗具灰白色或黄灰色长柔毛，并有稀疏小皮刺，有时混生腺毛；花梗长达1厘米；苞片卵状披针形，膜质，有柔毛；花萼密被绢状长柔毛；萼片卵状披针形，顶端渐尖，全缘，在果期常反折；花直径1—2厘米，花瓣紫红色至粉红色，倒卵形或宽椭圆形，基部微具柔毛；雄蕊有疏柔毛；雌蕊约25—40，花柱有长柔毛。果实近球形，红色至红黑色，宿存花柱具长柔毛。花期5—6月，果期7—8月。

产陕西、湖北、四川、贵州。生于海拔1000—3000米的山地空旷处或林中。

嫩叶可代茶。

153. 鸡爪茶(湖北) 老林茶(湖北兴山)，亨利莓(经济植物手册)，走牛修勒(贵州雷公山苗语)

Rubus henryi Hemsl. et Ktze. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:231. 1887 et in Hook. Icon. Pl. ser. 3. **8**:pl. 1705. 1887; Focke, Bibl. Bot. **72**(1):43. 1910; 中国树木分类学, 459. 图 356. 1937.

153a. 鸡爪茶(原变种)

R. henryi Hemsl. et Ktze. var. **henryi**

常绿攀援灌木，高达6米；枝疏生微弯小皮刺，幼时被绒毛，老时近无毛，褐色或红褐色。单叶，革质，长8—15厘米，基部较狭窄，宽楔形至近圆形，稀近心形，深3裂，稀5裂，分裂至叶片的2/3处或超过之，顶生裂片与侧生裂片之间常成锐角，裂片披针形或狭长圆形，长7—11厘米，宽1.5—2.5厘米，顶端渐尖，边缘有稀疏细锐锯齿，上面亮绿色，无毛，下面密被灰白色或黄白色绒毛，叶脉突起，有时疏生小皮刺；叶柄细，长3—6厘米，有绒毛；托叶长圆形或长圆披针形，离生，膜质，长1—1.8厘米，宽0.3—0.6厘米，全缘或顶端有2—3锯齿，有长柔毛。花常9—20朵，成顶生和腋生总状花序；总花梗、花梗和花萼密被灰白色或黄白色绒毛和长柔毛，混生少数小皮刺；花梗短，长达1厘米；苞片和托叶相似；花萼长约1.5厘米，有时混生腺毛；萼片长三角形，顶端尾状渐尖，全缘，花后反折；花瓣狭卵圆形，粉红色，两面疏生柔毛，基部具短爪；雄蕊多数，有长柔毛；雌蕊多数，被长柔毛。果实近球形，黑色，直径1.3—1.5厘米，宿存花柱带红色并有长柔毛；核稍有网纹。花期5—6月，果期7—8月。

产湖北、湖南。生坡地或山林中，海拔达2000米。

嫩叶可代茶。

153b. 大叶鸡爪茶(变种)(湖北植物志)

R. henryi Hemsl. et Ktze. var. **sozostylus** (Focke) Yü et Lu. stat. nov. — **R. sozostylus** Focke in Hook. Icon. Pl. ser. 3. **10**:in nota ad pl. 1952. 1891. — **R. fargesii** Franch. in Journ. de Bot. **8**:294. 1897. — **R. sozostylus** Focke var. **fargesii** (Franch.) Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris **23**:277. 1917.

本变种叶片基部宽，近楔形或心形，掌状5裂或3裂约至叶片中部或1/3处，裂片较