

产四川、云南、西藏。生海拔 1900—3000 米的杂木林下、林缘或山坡。缅甸北部、不丹、锡金、尼泊尔、印度北部、印度尼西亚爪哇均有分布。

182. 酢葡萄悬钩子(西藏植物志) 图版 29: 8—11

Rubus pectinarioides Hara in Journ. Jap. Bot. 47(4):111. 1972.

匍匐半灌木，高 5—18 厘米；茎匍匐，常无刺，节上生根；茎、叶柄和花梗均被红褐色软刺毛和柔毛。单叶，心状圆卵形或近圆形，长 2—4 厘米，宽 1.5—6 厘米，顶端圆钝，基部深心形，边缘波状 3—5 浅裂，两面疏生柔毛，老时逐渐脱落，下面沿叶脉具软刺毛，边缘有不整齐锐锯齿或稍钝锯齿；叶柄长 2—5 厘米；托叶椭圆形，离生，顶端圆钝或急尖，全缘或顶端有锯齿，具柔毛。花单生或 2—3 朵，顶生；花梗长 3.5—6 厘米；苞片形状与托叶相似，常 2 枚对生于花梗中部；花直径 1.5—2.3 厘米；花萼外密被红褐色软刺毛和柔毛，内面密被白色绒毛；萼片卵状披针形，长 0.8—1.3 厘米，顶端尾尖，浅条裂，稀不裂；花瓣近圆形或宽倒卵形，粉红色，长 8—11 毫米，宽 7—10 毫米，顶端圆钝，基部具爪，稍长或几与萼片近等长；雄蕊多数，花丝宽扁，几与花柱等长；雌蕊多数，子房无毛。果实近球形，直径 1—1.5 厘米，包藏在宿萼内，红色，无毛；核较光滑。 花期 7—8 月，果期 9—10 月。

产云南西北部高黎贡山北段西坡、西藏东南部。生于山溪边岩石上或石砾坡地林下，海拔 2800—3300 米。不丹、锡金也有分布。

此种和齿萼悬钩子 *R. calycinus* Wall. ex D. Don 相近，区别在于本种茎、叶柄、花梗和花萼均被红褐色刺毛，无针刺；叶柄较短，长 2—5 厘米；花较小，直径 1.5—2.3 厘米；萼片卵状披针形，顶端常浅条裂，稀不裂。

据本所收集的云南、西藏标本记录，花为白色。但日人原宽 (Hara) 描述，不丹标本花为粉红色，其余茎、叶、花和果实特征均极近似。

183. 玉山悬钩子(台湾木本植物志)

Rubus calycinoides Hayata, Icon. Pl. Formos. 3:88. 1913; Koidz. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 34(2):154. 1913. non Ktze. 1879; Liu et Su in Fl. Taiwan 3: 109. 1977.

183a. 玉山悬钩子(原变种)

R. calycinoides Hayata var. **calycinoides**

矮小半灌木，高达 12 厘米；茎匍匐，常节上生根，具绒毛状柔毛和稀疏针刺，或几无刺，老时毛渐脱落。单叶，厚，心状宽卵形至近圆形，直径 2—3 厘米，顶端圆钝，基部心形，边缘 3—5 裂，裂片圆形，具不整齐圆钝锯齿，上面常无毛，深绿色，叶脉下陷，有泡状隆起，下面叶脉突起，除沿叶脉有长柔毛和极稀疏针刺外，均密被棕灰色绒毛；叶柄几与叶片等长，被绒毛状柔毛和稀疏针刺；托叶分离，膜质，倒卵形至近长圆形，长 0.7—1.2 厘米，顶端梳齿状或掌状条裂，基部渐狭，上面无毛，下面有绒毛状柔毛。花单生或 1—2 朵，顶生或腋生，直径达 2 厘米；花梗长 0.5—0.9 厘米，密被绒毛状柔毛和疏生针刺；苞片和托叶相似；