

- 78. 莓叶委陵菜 *P. fragarioides* L.
2. 叶为掌状三出复叶。
3. 植株全身被星状毛, 小叶片上半部边缘有多数锯齿; 花 1—2 朵, 直径 10—15 毫米 77. 星毛委陵菜 *P. acaulis* L.
3. 植株被疏柔毛或脱落几无毛, 不被星状毛。
4. 小叶下面被疏柔毛或脱落几无毛; 花直径 10—20 毫米, 副萼片长圆形, 顶端圆钝; 花药小, 近圆形或卵形, 花丝基部着生 76. 耐寒委陵菜 *P. gelida* C. A. Mey.
4. 小叶下面被平铺糙毛或密被柔毛; 花直径 8—10 毫米, 副萼片披针形, 渐尖; 花药大, 椭圆形, 长比宽在 2 倍以上, 花丝背部着生 79. 三叶委陵菜 *P. freyniana* Borum
1. 茎平卧或匍匐, 常在节处生根。
5. 叶为掌状三出复叶。
6. 边缘两个小叶浅裂或深裂为两部分, 小叶下面伏生绢状疏柔毛 81b. 绢毛匍匐委陵菜 *P. reptans* L. var. *sericophylla* Franch.
6. 小叶不分裂。
7. 小叶菱状卵形、菱状倒卵形或广椭圆形, 边缘有少数卵形条裂状锯齿或重锯齿, 齿端尖锐; 匍匐枝在节处呈膝曲状; 花直径 15—20 毫米 80. 曲枝委陵菜 *P. yokusaiana* Makino
7. 小叶倒卵形或椭圆形, 边缘锯齿整齐, 急尖或圆钝; 匍匐不呈膝曲状, 花直径 7—10 毫米 82. 等齿委陵菜 *P. simulatrix* Wolf
5. 叶为掌状五出复叶。
8. 花直径 15—22 毫米, 副萼片常较宽阔, 顶端圆钝或急尖, 花后增大呈叶状; 小叶倒卵长圆形, 边缘锯齿相等, 顶端圆钝, 稀急尖 81a. 匍匐委陵菜 *P. reptans* L.
8. 花直径 10—15 毫米, 副萼片狭窄, 顶端渐尖, 稀急尖, 花后不增大; 小叶长圆披针形, 锯齿极不相等, 顶端急尖或渐尖 83. 匍枝委陵菜 *P. flagellaris* Willd. ex Schlecht.

系 15. 小药系——*Ser. Aureae* (Wolf) Yü et Li, grad. nov. ——Gruppe *Aureae* Wolf in Asch. & Gr. Syn. Mitteleurop. **6**:671. 1904. ——*Grex Aureae* Wolf in Bibl. Bot. **71**:51. 521. 1908. ——Sect. *Aureae* (Wolf) Juzep. in Fl. URSS **10**:197. 1941.

本系我国有下列 2 种。


76. 耐寒委陵菜 图版 50:1—3

Potentilla gelida C. A. Mey. Ind. Plant. in Cauc. et ad mare Casp. Collect. 167. 1831; Wolf in Bibl. Bot. **71**:535. 1908. ——*P. fragiformis* Willd. ex Schlecht. var. *gelida* Trautv. Enum. Pl. Song. no. 410. 1864—1868. ——*P. gelida* C. A. Mey. var. *genuina* Wolf in Bibl. Bot. **71**:536. 1908. ——*P. grandiflora* auct. non L. 1753: Bge. in Ldb. Fl. Alt. **2**:259. 1830.

76a. 耐寒委陵菜(原变种)

P. gelida C. A. Mey. var. *gelida*

多年生草本。根圆柱形, 细长, 常侧生须根。花茎常纤细, 直立或上升, 高 6—30 厘米, 被稀疏柔毛或无柄腺体, 稀脱落几无毛。基生叶掌状 3 出复叶, 连叶柄长 2.5—7 厘



1—3. 耐寒委陵菜 *Potentilla gelida* C. A. Mey.: 1. 植株, 2. 雄蕊, 3. 心皮及花柱. 4—6. 星毛委陵菜 *Potentilla acaulis* L.: 4. 植株, 5. 雄蕊, 6. 心皮及花柱. (冀朝桢绘)