

Nat. Pflanzenfam. 3(3):47. 1888; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 429. 1951. —
Rosa sect. *Eglanteriae* DC. in Ser. Mus. Helv. Hist. Nat. 1:3. 1818. p. p. —*Rosa* div.
Simplicifolia Lindl. Ros. Monogr. 1. 1820. —*Rosa* groupe *Simplicifolia* Thory, Prodr. Monogr. Ros. 33. 1920. —*Rosa* ser. *Pallasiana* Tratt. Ros. Monogr. 213. 1823. —*Hulthemia* Dumort. Not. Nouv. Gen. Pl. 13. 1824; Juzep. in Fl. URSS 10:506. 1941. —
Lowea Lindl. in Bot. Reg. 15:t. 1261. 1829.

本亚属我国产 1 种。

1. 小薔薇 单叶蔷薇(中国高等植物图鉴)

Rosa berberifolia Pall. in Nov. Act. Acad. Sci. Petrop. 10:379. t. 10(5). 1797.
 —*Hulthemia berberifolia* (Pall.) Dumort. Not. Nouv. Gen. Pl. 13. 1824; Ldb. Fl. Ross. 2:78. 1844; Juzep. in Fl. URSS 10:506. 1941. —*Rosa persica* auct. non Michx. ex Juss. 1789; 经济植物手册 1(2): 624. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 244. 图 2217. 1972.

低矮铺散灌木，高 30—50 厘米；小枝嫩时黄色，光滑，老时暗褐色，粗糙，无毛；皮刺黄色，散生或成对生于叶片基部，弯曲或直立，有时混有腺毛。单叶，叶片椭圆形、长圆形、稀卵形，长 1—2 厘米，宽 5—10 毫米，先端急尖或圆钝，基部近圆形稀宽楔形，边缘有锯齿，近基部全缘，两面无毛或下面在幼时有稀疏短柔毛；无柄或近无柄；无托叶。花单生，直径 2—2.5 厘米；花梗长 1—1.5 厘米，无毛或有针刺；萼片披针形，先端尾尖或长渐尖，外面有短柔毛和稀疏针刺，内面有灰白色绒毛；萼筒外被长针刺；花瓣黄色，基部有紫红色斑点，倒卵形，比萼片稍长；雄蕊紫色，多数，着生在坛状花托口部的周围；心皮多数，花柱离生，密被长柔毛，比雄蕊短。果实近球形，直径约 1 厘米，紫褐色，无毛，密被针刺，萼片宿存。花期 5—6 月，果期 7—9 月。

产我国新疆。生于山坡、荒地或路旁干旱地区，海拔 120—550 米。苏联也有分布。

本种与分布在中亚、帕米尔、阿尔泰和伊朗等地的波斯蔷薇 *R. persica* Michx. ex Juss. 极为近似，惟后者小枝、皮刺和叶片均密被短柔毛，易于识别。

亚属 2. 蔷薇亚属——Subgen. *Rosa* ——Subgen. *Eurosa* Focke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(3):47. 1888; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 430. 1951.

本亚属我国有以下 9 组。

组 1. 芹叶组——Sect. *Pimpinellifoliae* DC. ex Ser. Mus. Helv. Nat. Helv. 1:3. 1818; Lindl. Ros. Monogr. 36. 1820. p.p.; Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 8:235. (Prim. Monogr. Rosa. 14) 1869; Rehd. et wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:343. 1915. Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 430. 1951. —*Rosa* sect. *Eglanteriae* DC. ex Ser. l. c. 1818. —*Rosa* div. *Rubiginosae* Lindl. Ros. Monogr. 84. 1820. p.p. —*Rosa* groupe *Spinossima* Thory, Prodr.

Monogr. Ros. 40. 1820. p.p. ——*Rosa groupe Hispidae* Thory, op. cit. 47. 1820. p.p. ——
Rosa sect. *Cinramomeae* Ser. in DC. Prodr. 2:602. 1825. p.p. ——*Rosa* sect. *Luteae* Crép.
 in Bull. Soc. Bot. Belg. 11:97. (Prim. Monogr. Ros. 213) 1872, et in Journ. Hort. Soc.
 Lond. 11:225. 1889; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:342. 1915. ——*Rosa* sect. *Sericæae* Crép. op. cit. 11:226. 1889; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:343. 1915.

本组分布欧亚两洲。我国产 18 种，分为两系。

芹叶组分种检索表

1. 萼片和花瓣均为五数。(五数花系 Ser. *Spinosissimae* Yü et Ku)
 2. 着花的枝密被针刺和皮刺，稀无刺。
 3. 小叶边缘为单锯齿或在同一株上有单锯齿或重锯齿，下面无腺点。
 4. 小叶 7—9，稀 5 或 11。
 5. 小叶片长圆形、长圆卵形或近圆形，长 1—2.2 厘米；花直径 2—5 厘米；果近球形，黑色或暗褐色 2. 密刺蔷薇 *R. spinosissima* L.
 5. 小叶片卵形或椭圆形，长 5—18 毫米；花直径 1.5—2 厘米；果椭圆形或卵状长圆形 3. 刺毛蔷薇 *R. farreri* Stapf
 4. 小叶 7—11(—13)，椭圆形、倒卵椭圆形或长圆椭圆形 4. 长白蔷薇 *R. koreana* Kom.
 3. 小叶边缘为重锯齿，下面有腺 5. 腺叶蔷薇 *R. kokanica* Regel
 2. 着花的枝仅具皮刺，极稀具针刺。
 6. 花瓣黄色。
 7. 小叶具单锯齿，下面无腺。
 8. 小叶 5—9，近圆形、倒卵形或椭圆形，边缘上半部有锯齿，基部全缘，无毛 6. 宽刺蔷薇 *R. platyacantha* Schrenk
 8. 小叶 5—13，边缘全部具齿，有毛或无毛。
 9. 小叶片卵形、椭圆形或倒卵形，无毛，边缘有锐锯齿；花直径 4—5.5 厘米；枝条基部有时具针刺 7. 黄蔷薇 *R. hugonis* Hemsl.
 9. 小叶片宽卵形或近圆形，稀椭圆形，下面被稀疏柔毛，边缘锯齿较圆钝；花直径 3—4(—5) 厘米；枝条基部无针刺 8. 黄刺玫 *R. xanthina* Lindl.
 7. 小叶具重锯齿，下面有腺。
 10. 小叶 9—15，稀 7，椭圆形、椭圆倒卵形至长椭圆形，下面无毛；花淡黄或黄白色，直径 2.5—4 厘米，萼片先端渐尖 9. 樱草蔷薇 *R. primula* Bouleng.
 10. 小叶 5—9，稀 11，宽卵形或倒卵形，下面有毛；花直径 4—5 厘米，黄色重瓣，萼片先端叶状 10. 重瓣异味蔷薇 *R. foetida* Herrm.f. *persiana* (Lem.) Regel
 6. 花瓣白色、淡粉至红色。
 11. 小叶 3—7，椭圆形至长圆形，边缘有单锯齿；托叶披针形，有丝裂和腺齿；花白色，直径 1.8—2.5 厘米；萼片卵形，花梗长约 1.5 厘米，有腺或无腺 11. 高山蔷薇 *R. transmorrisonensis* Hayata
 11. 小叶 9—13，卵形至椭圆形，重锯齿或部分单锯齿，托叶宽倒披针形，有腺毛。
 12. 小叶 (7)9—11；花粉红色或淡粉色，直径 3—4 厘米；花梗长 1.5—3 厘米，被腺毛 12. 细梗蔷薇 *R. graciliflora* Rehd. et Wils.

12. 小叶 11—13；花白色，直径 2.5—3 厘米，花梗长 1.5—2 厘米，无毛.....
.....13. 泰岭蔷薇 *R. tsinglingensis* Pax. et Hoffm.
1. 萼片和花瓣均为四数(四数花系 Ser. Sericeae (Crép.) Yü et Ku)
13. 小叶边缘为单锯齿，下面无腺。
14. 果熟时果梗膨大。
15. 小叶 7—9(—13)，长圆形至长圆倒卵形，仅先端有锯齿，下面无毛，有短刺；花瓣淡黄色；果倒圆锥形，桔黄色 14. 求江蔷薇 *R. taronensis* Yü et Ku
15. 小叶 9—17，长圆形或椭圆长圆形，全边有锯齿，下面无毛或在中脉上有短柔毛；花瓣白色，果倒卵球形，红色或黄色 15. 峨眉蔷薇 *R. omeiensis* Rolfe
14. 果熟时果梗不膨大。
16. 小叶片两面无毛，7—11 片，长圆形或宽倒卵形，中部以上有尖锐锯齿，皮刺常成对；果梨形或倒卵形，长约 1.5 厘米 16. 玉山蔷薇 *R. morrisonensis* Hayata
16. 小叶片下面或两面均密被柔毛。
23. 小叶 7—11(—13)，卵形或倒卵形，倒卵长圆形，仅上半部有锯齿，上面无毛，下面被丝状柔毛；果球形或倒卵球形，直径 8—15 毫米 17. 绒毛蔷薇 *R. sericea* Lindl.
23. 小叶 5—9(—11)，长圆倒卵形，两面密被柔毛；果倒卵圆形，直径约 1 厘米.....
.....18. 毛叶蔷薇 *R. mairei* Lévl.
13. 小叶边缘为重锯齿，下面及重锯齿均有腺 19. 川西蔷薇 *R. sikangensis* Yü et Ku

系 1. 五数花系——Ser. *Spinosissimae* Yü et Ku, in Bull. Bot. Res. 1(4):2.1981. ——
Sect. *Luteae* Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 11:97. 1872; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils.
2:342. 1915.

本系有下列 12 种。

2. 密刺蔷薇

Rosa spinosissima L. Sp. Pl. 491. 1755. p. p.; Willmott, Gen. Ros. 2:247. 1911;
Juzep. in Fl. URSS 10:470. pl. 27. f. 2. 1941; 中国高等植物图鉴 2: 244. 图 2218.
1972. ——*R. pimpinellifolia* L. Syst. Nat. ed. 10. 2:1062. 1759; Bouleng. in Bull. Jard.
Bot. Bruxell. 13:172. 1935.

2a. 密刺蔷薇(原变种)

R. spinosissima* L. var. *spinosissima

矮小灌木，高约 1 米；枝开展或弯曲，无毛；当年小枝紫褐色或红褐色，有直立皮刺和密被针刺。小叶 5—11，通常 7—9；连叶柄长 4—8 厘米；小叶片长圆形、长圆状卵形或近圆形，长 1—2.2 厘米，宽 6—12 毫米，先端圆钝或急尖，基部近圆形或宽楔形，边缘有单锯齿或部分重锯齿，幼时齿尖带腺，上面深绿色，下面淡绿色，两面无毛；叶轴和叶柄有少数针刺和腺毛；托叶大部贴生于叶柄，顶端部分分离，卵形，全缘或有齿，齿尖常有腺。花单生于叶腋或有时 2—3 朵集生，无苞片；花梗长 1.5—3.5 厘米，幼时微有柔毛，以后脱落，有腺毛或无腺毛；花直径 2—5 厘米；萼片披针形，先端渐尖或尾状渐尖，全缘，外面无毛，内面有白色柔毛，边缘较密；花瓣白色、粉色至淡黄色，宽倒卵形，先端微凹，基部宽楔形；花