

离生，不伸出，有柔毛。果球形，红色。

原产西亚。我国有下列栽培变型。

重瓣异味蔷薇(变型)

10b. *R. foetida* Herrm. f. *persiana* (Lem.) Rehd. in Mitt. Deuts. Dendr. Ges. 1915 (24):222. 1916.

花重瓣，黄色，直径4—6.5厘米。

我国新疆(于田)栽培。

11. 高山蔷薇(台湾木本植物志)

Rosa transmorrisonensis Hayata, Ic. Pl. Formos. 3:97. 1913; Li, Woody Fl. Taiwan 300. 1963; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:103. 1977.

矮生常绿灌木；小枝无毛，常有散生或对生皮刺，小叶5—7，稀3；小叶片椭圆形或长圆形，顶生叶片较大，长5—25毫米，先端圆钝至急尖或平截，上面近无毛，下面在中脉上有短柔毛，边有尖锐锯齿，或有稀疏腺毛；叶轴和叶柄有柔毛、腺毛和稀疏皮刺；托叶披针形，长约1厘米，大部分连于叶柄，边有腺毛，近无毛或两面被稀疏柔毛。花单生或3—5成聚伞花序；花梗长约1.5厘米，有腺毛；萼片三角卵形，先端渐尖，内面被绒毛，外面被柔毛和腺毛，边缘有裂片及腺毛；花瓣5，白色，倒卵形，长约1厘米，宽约6毫米，先端微凹；花柱9—10，丝状，无毛或近无毛。果近球形，直径约6毫米。

特产我国台湾。海拔2400米以上高山。

据《台湾植物志》检索表中，将本种花柱列为合柱组，而在《台湾植物图谱》早田文藏的原始记载为花柱9—10，丝状，长约5毫米，伸出萼筒之外。本种究竟应属于何组，由于手边资料缺乏，不能臆断，暂附于此，以待日后研究决定。

12. 细梗蔷薇(华北经济植物志要)

Rosa graciliflora Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:330. 1915.

小灌木，高约4米；枝圆柱形，有散生皮刺；小枝纤细，无毛或近于无毛，有时有腺毛。小叶9—11，稀7，连叶柄长5—8厘米；小叶片卵形或椭圆形，长8—20毫米，宽7—12毫米，先端急尖或圆钝，基部楔形或近圆形，边缘有重锯齿或部分为单锯齿，齿尖有时有腺，上面深绿色，无毛，下面淡绿色，无毛或有稀疏柔毛，常有腺；叶轴和叶柄散生稀疏皮刺和腺毛；托叶大部贴生于叶柄，离生部分呈耳状，边缘有腺齿，无毛。花单生于叶腋，基部无苞片；花梗长1.5—2.5厘米，无毛，有时有稀疏的腺毛；花直径2.5—3.5厘米；萼筒、萼片外面无毛，萼片卵状披针形，先端呈叶状，全缘或有时有齿，内面有白色绒毛；花瓣粉红色或深红色，倒卵形，先端微凹，基部楔形；雄蕊多数，着生在坛状萼筒口部周围；花柱离生，稍外伸出，密被柔毛。果倒卵形至长圆倒卵形，长2—3厘米，红色，有宿存直立萼片。花期7—8月，果期9—10月。

产四川、云南、西藏。多生于山坡、云杉林下或林边灌丛中，海拔3300—4500米。模