

野薔薇变种检索表

1. 花白色。

2. 花单瓣, 花直径 1.5—2 厘米, 花梗有短柔毛……………58a. 野薔薇 var. *multiflora*2. 花重瓣, 花直径 2—3 厘米, 花梗有短柔毛……………58d. 白玉堂 var. *albo-plena* Yü et Ku

1. 花粉色至粉红色。

3. 花单瓣, 花直径 2—4 厘米, 花梗无毛或有腺……………58b. 粉团薔薇 var. *cathayensis* Rehd. et Wils.3. 花重瓣, 花直径 3—4 厘米, 花梗无毛……………58c. 七姊妹 var. *carnea* Thory

58b. 粉团薔薇 红刺玫(陕西) 图版 68:1—3

Rosa multiflora Thunb. var. *cathayensis* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:304. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 13:311. 1932; 江苏南部种子植物手册 358. 1959; 秦岭植物志 1(2): 572. 图 474. 1974. — *R. gentiliana* Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. 55:55. 1908; Willmott, Gen. Ros. 2:513. t. 1914. — *R. macrophylla* Lindl. var. *hypoleuca* Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 354. 1915. nom. nud. — *R. cathayensis* (Rehd.) Bailey in Gent. Herb. 1:29. 1920; Hu Icon Pl. Sin. 2:26. Pl. 76. 1929; 广州植物志 295. 1956. — *R. calva* var. *cathayensis* Bouleng. in Bull. Jard. Bot. Bruxell. 9:271. 1933. — *R. multiflora* var. *gentiliana* (Lévl. & Vant.) Yü et Tsai in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. ser. 7:117. 1936. — *R. kwangsiensis* Li in Journ. Arn. Arb. 26: 63. 1945.

本变种花为粉红色, 单瓣。

产河北、河南、山东、安徽、浙江、甘肃、陕西、江西、湖北、广东、福建。多生于山坡、灌丛或河边等处, 海拔可达 1300 米。

根多含鞣质 23—25%, 可提制栲胶, 鲜花含有芳香油可提制香精用于化妆品工业, 根、叶、花和种子均入药, 根能活血通络收敛, 叶外用治肿毒, 种子称营实能峻泻、利水通经。华北常见栽培作绿篱、护坡及棚架绿化材料。繁殖用种子或扦插均可。

58c. 七姊妹(群芳谱) 十姊妹(群芳谱)

R. multiflora Thunb. var. *carnea* Thory in Redouté, Roses, 2:67. t. 1821; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:305. 1915; 江苏南部种子植物手册 358. 1959. Hara in Enum. Flow. Pl. Nepal 2:143. 1979. — *R. multiflora* Thunb. var. *platyphylla* Thory in Redouté, Roses, 2:69. t. 1821; 秦岭植物志 1(2): 573. 1974. — *R. lebrunei* Lévl. in Bull. Acad. Géog. Bot. 25:46. 1915, et Cat. Pl. Yunnan 235. 1917. — *R. blinii* Lévl. in Bull. Acad. Géog. Bot. 25:46. 1915, et Cat. Pl. Yunnan 234. 1917. — *R. multiflora* Thunb. var. *carnea* Thory f. *platyphylla* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 306. 1915.

本变种为重瓣, 粉红色。栽培供观赏, 可作护坡及棚架之用。

58d. 白玉堂

R. multiflora Thunb. var. *albo-plena* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):12. 1981.