

野薔薇变种检索表

1. 花白色。

2. 花单瓣, 花直径 1.5—2 厘米, 花梗有短柔毛……………58a. 野薔薇 var. *multiflora*
 2. 花重瓣, 花直径 2—3 厘米, 花梗有短柔毛……………58d. 白玉堂 var. *albo-plena* Yü et Ku

1. 花粉色至粉红色。

3. 花单瓣, 花直径 2—4 厘米, 花梗无毛或有腺……………58b. 粉团薔薇 var. *cathayensis* Rehd. et Wils.
 3. 花重瓣, 花直径 3—4 厘米, 花梗无毛……………58c. 七姊妹 var. *carnea* Thory

58b. 粉团薔薇 红刺玫(陕西) 图版 68:1—3

Rosa multiflora Thunb. var. *cathayensis* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:304. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 13:311. 1932; 江苏南部种子植物手册 358. 1959; 秦岭植物志 1(2): 572. 图 474. 1974. — *R. gentiliana* Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. 55:55. 1908; Willmott, Gen. Ros. 2:513. t. 1914. — *R. macrophylla* Lindl. var. *hypoleuca* Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 354. 1915. nom. nud. — *R. cathayensis* (Rehd.) Bailey in Gent. Herb. 1:29. 1920; Hu Icon Pl. Sin. 2:26. Pl. 76. 1929; 广州植物志 295. 1956. — *R. calva* var. *cathayensis* Bouleng. in Bull. Jard. Bot. Bruxell. 9:271. 1933. — *R. multiflora* var. *gentiliana* (Lévl. & Vant.) Yü et Tsai in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. ser. 7:117. 1936. — *R. kwangsiensis* Li in Journ. Arn. Arb. 26: 63. 1945.

本变种花为粉红色, 单瓣。

产河北、河南、山东、安徽、浙江、甘肃、陕西、江西、湖北、广东、福建。多生于山坡、灌丛或河边等处, 海拔可达 1300 米。

根多含鞣质 23—25%, 可提制栲胶, 鲜花含有芳香油可提制香精用于化妆品工业, 根、叶、花和种子均入药, 根能活血通络收敛, 叶外用治肿毒, 种子称营实能峻泻、利水通经。华北常见栽培作绿篱、护坡及棚架绿化材料。繁殖用种子或扦插均可。

58c. 七姊妹(群芳谱) 十姊妹(群芳谱)

R. multiflora Thunb. var. *carnea* Thory in Redouté, Roses, 2:67. t. 1821; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:305. 1915; 江苏南部种子植物手册 358. 1959. Hara in Enum. Flow. Pl. Nepal 2:143. 1979. — *R. multiflora* Thunb. var. *platyphylla* Thory in Redouté, Roses, 2:69. t. 1821; 秦岭植物志 1(2): 573. 1974. — *R. lebrunei* Lévl. in Bull. Acad. Géog. Bot. 25:46. 1915, et Cat. Pl. Yunnan 235. 1917. — *R. blinii* Lévl. in Bull. Acad. Géog. Bot. 25:46. 1915, et Cat. Pl. Yunnan 234. 1917. — *R. multiflora* Thunb. var. *carnea* Thory f. *platyphylla* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 306. 1915.

本变种为重瓣, 粉红色。栽培供观赏, 可作护坡及棚架之用。

58d. 白玉堂

R. multiflora Thunb. var. *albo-plena* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):12. 1981.

花白色,重瓣。

北京常见栽培,扦插易生根,常作嫁接月季花的砧木。

59. 单花合柱蔷薇

Rosa uniflora Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):12. 1981.

小灌木。老枝弯曲,灰褐色,多分枝;小枝细弱,圆柱形,弓曲,褐色或紫褐色,有明显条纹,近无毛,有短扁、散生或对生皮刺。小叶5—7,连叶柄长2.5—3.5厘米;小叶片倒卵形或宽椭圆形,长7—10毫米,宽5—7毫米,先端急尖或钝,基部宽楔形或近圆形,边缘有三角形单锯齿或近重锯齿,带紫色,上面深绿色,有散生柔毛,下面淡绿色,被柔毛,沿叶脉更密,中脉突起;顶生小叶柄较长,侧生小叶柄短,总叶柄密被柔毛和腺毛;托叶大部贴生于叶柄,篦齿状,边缘和两面均被稀疏柔毛和密集腺毛。花单生于叶腋;花梗长不到1厘米,有稀疏柔毛和腺毛;基部有2—3枚苞片,苞片卵状披针形,边缘和外面密被腺毛,花直径2—2.5厘米;萼筒长圆形,萼片披针形,长约5毫米,先端渐尖,全缘或偶有分裂,萼筒和萼片外面密被腺毛,内面密被柔毛;花瓣白色,长圆倒卵形,先端凹,基部楔形,比萼片长约1倍;雄蕊多数;花柱结合成束,无毛,比雄蕊短。果实未见。

产浙江(岱山高亭岭)。生海滨阳处。

本种与野蔷薇 *R. multiflora* Thunb. 和光叶蔷薇 *R. wichuraiana* Crép. 相近似,但本种与前者不同,花单生;小叶片较小,长不超过1厘米,两面被毛。而与后者的区别,花单生,花柱无毛;小叶片两面被毛,均易于区别。

60. 广东蔷薇(广州植物志) 野蔷薇(广东)

Rosa kwangtungensis Yü et Tsai in Bull. Farn. Mem. Inst. Biol. Bot. ser. 7:114. 1936; Chun in Sunyatsenia 4:209. 1940; 广州植物志 295. 1956.

60a. 广东蔷薇(原变种) 图版 69:1—2

R. kwangtungensis Yü et Tsai var. *kwangtungensis*

攀援小灌木,有长匍枝;枝暗灰色或红褐色,无毛;小枝圆柱形,有短柔毛,皮刺小,基部膨大,稍向下弯曲。小叶5—7,连叶柄长3.5—6厘米;小叶片椭圆形、长椭圆形或椭圆状卵形,长1.5—3厘米,宽8—15毫米,先端急尖或渐尖,基部宽楔形或近圆形,边缘有细锐锯齿,上面暗绿色,沿中脉有柔毛,下面淡绿色,被柔毛,沿中脉和侧脉较密,中脉突起,密被柔毛,有散生小皮刺和腺毛;托叶大部贴生于叶柄,离生部分披针形,边缘有不规则细锯齿,被柔毛。顶生伞房花序,直径5—7厘米,有花4—15朵;花梗长1—1.5厘米,总花梗和花梗密被柔毛和腺毛;花直径1.5—2厘米;萼筒卵球形,外被短柔毛和腺毛,逐渐脱落,萼片卵状披针形,先端长渐尖,全缘,两面有毛,边缘较密,外面混生腺毛;花瓣白色,倒卵形,比萼片稍短;花柱结合成柱,伸出,有白色柔毛,比雄蕊稍长。果实球形,直径7—10毫米,紫褐色,有光泽,萼片最后脱落。花期3—5月,果期6—7月。

产广东、广西、福建。多生于山坡、路旁、河边或灌丛中,海拔100—500米。模式标本