

Cycl. Am. Hort. 4:1552. 1902; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:316. 1915.

76a. 木香花(原变种)

R. banksiae Ait. var. **banksiae**

攀援小灌木,高可达6米;小枝圆柱形,无毛,有短小皮刺;老枝上的皮刺较大,坚硬,经栽培后有时枝条无刺。小叶3—5,稀7,连叶柄长4—6厘米;小叶片椭圆状卵形或长圆披针形,长2—5厘米,宽8—18毫米,先端急尖或稍钝,基部近圆形或宽楔形,边缘有紧贴细锯齿,上面无毛,深绿色,下面淡绿色,中脉突起,沿脉有柔毛;小叶柄和叶轴有稀疏柔毛和散生小皮刺;托叶线状披针形,膜质,离生,早落。花小形,多朵成伞形花序,花直径1.5—2.5厘米;花梗长2—3厘米,无毛;萼片卵形,先端长渐尖,全缘,萼筒和萼片外面均无毛,内面被白色柔毛;花瓣重瓣至半重瓣,白色,倒卵形,先端圆,基部楔形;心皮多数,花柱离生,密被柔毛,比雄蕊短很多。花期4—5月。

产四川、云南。生溪边、路旁或山坡灌丛中,海拔500—1300米。全国各地均有栽培。

花含芳香油,可供配制香精化妆品用。著名观赏植物,常栽培供攀援棚架之用。性不耐寒,在华北、东北只能作盆栽,冬季移入室内防冻。

木香花种下等级检索表

- 1. 花白色。
 - 2. 花重瓣至半重瓣..... 76a. 木香花 var. **banksiae**
 - 2. 花单瓣..... 76b. 单瓣白木香 var. **normalis** Regel
- 1. 花黄色。
 - 3. 花重瓣..... 76c. 黄木香花 f. **lutea** (Lindl.) Rehd.
 - 3. 花单瓣..... 76d. 单瓣黄木香 f. **lutescens** Voss.

76b. 单瓣白木香 七里香(陕西) 图版 67: 8—10

R. banksiae Ait. var. **normalis** Regel in Acta Hort. Petrop. 5:376. 1878; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:317. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:526. 1933; 秦岭植物志 1(2): 576. 图 476. 1974. — *R. banksiae* auct. non Ait.: Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 14:162. 1875.

花白色,单瓣,味香;果球形至卵球形,直径5—7毫米,红黄色至黑褐色,萼片脱落。此为木香花野生原始类型。

产河南、甘肃、陕西、湖北、四川、云南、贵州。生沟谷中,海拔500—1500米。

根皮含鞣质19%,可供制栲胶,又供药用,称红根,能活血、调经、消肿。

76c. 黄木香花

R. banksiae Ait. f. **lutea** (Lindl.) Rehd. in Bibliog. 316. 1949. — *R. banksiae* var. **lutea** Lindl. in Bot. Reg. 13:t. 1105. 1827. — *R. banksiae* var. **lutea-plena** Rehd.