

2:181. 1823. — *R. amygdalifolia* Ser. in DC. Prodr. 2:601. 1825. — *R. argyi* Lévl. in Bull. Soc. Bot. Fr. 55:56. 1908; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18:257. 1937. in obs. — *R. laevigata* var. *kaiscianensis* Pampanini in Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17:294. 1910. — *R. sinica* auct. non L. 1789: Hook. in Curtis's Bot. Mag. 55: t. 2848. 1828.

78a. 金樱子(原变型) 图版 71: 1—3

R. laevigata* Michx. f. *laevigata

常绿攀援灌木, 高可达 5 米; 小枝粗壮, 散生扁弯皮刺, 无毛, 幼时被腺毛, 老时逐渐脱落减少。小叶革质, 通常 3, 稀 5, 连叶柄长 5—10 厘米; 小叶片椭圆状卵形、倒卵形或披针状卵形, 长 2—6 厘米, 宽 1.2—3.5 厘米, 先端急尖或圆钝, 稀尾状渐尖, 边缘有锐锯齿, 上面亮绿色, 无毛, 下面黄绿色, 幼时沿中肋有腺毛, 老时逐渐脱落无毛; 小叶柄和叶轴有皮刺和腺毛; 托叶离生或基部与叶柄合生, 披针形, 边缘有细齿, 齿尖有腺体, 早落。花单生于叶腋, 直径 5—7 厘米; 花梗长 1.8—2.5 厘米, 偶有 3 厘米者, 花梗和萼筒密被腺毛, 随果实成长变为针刺; 萼片卵状披针形, 先端呈叶状, 边缘羽状浅裂或全缘, 常有刺毛和腺毛, 内面密被柔毛, 比花瓣稍短; 花瓣白色, 宽倒卵形, 先端微凹; 雄蕊多数; 心皮多数, 花柱离生, 有毛, 比雄蕊短很多。果梨形、倒卵形, 稀近球形, 紫褐色, 外面密被刺毛, 果梗长约 3 厘米, 萼片宿存。花期 4—6 月, 果期 7—11 月。

产陕西、安徽、江西、江苏、浙江、湖北、湖南、广东、广西、台湾、福建、四川、云南、贵州等省区。喜生于向阳的山野、田边、溪畔灌木丛中, 海拔 200—1600 米。

根皮含鞣质可制栲胶, 果实可熬糖及酿酒。根、叶、果均入药, 根有活血散瘀、祛风除湿、解毒收敛及杀虫等功效; 叶外用治疮疖, 烧烫伤; 果能止腹泻并对流感病毒有抑制作用。

78b. 重瓣金樱子(变型)

***R. laevigata* Michx. f. *sempilena* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):17. 1981.**

本变种花为半重瓣, 直径 5—9 厘米。

产江西(浮梁)。生向阳山地。

组 8. 硕苞组 — Sect. Bracteatae Thory, Prodr. Monogr. Ros. 125. 1820; Lindl Ros. Monogr. 7. 1820. sp. nonnull. excl.; Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 11:96. (Prim. Monogr. Ros. 212) 1872; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:337. 1915; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 450. 1951. — *Rosa* sect. *Chinenses* DC. ex Ser. Mus. Helv. Hist. Nat. 1:2. 1818. p. p. — *Rosa* ser. *Redouteana* Tratt. Ros. Monogr. 2:105. 1823. — *Rosa* ser. *Wendlandiana* Tratt. op. cit. 188. 1823.

本组 2 种, 产亚洲, 我国产 1 种。

79. 硕苞蔷薇 野毛栗, 糖钵(浙江)

Rosa bracteata Wendl. Obs. Bot. 50. 1798; Sims. in Curtis's Bot. Mag. 36: t. 1377. 1811; Willmott, Gen. Ros. 1:125. t. 1911; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:337. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:526. 1933; Li, Woody Fl. Taiwan 295. f. 109. 1963; 中国高等植物图鉴 2: 254. 图 2238. 1972; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:97. 1977. — *R. macartnea* Dumont de Courserent. Bot. Cult. 5:460. 1805. — *R. sinica* β *braamiana* Regel in Acta Hort. Petrop. 5:327. 1878. — *R. lucida* auct. non Ehrh.: Lawrence, Roses, t. 84. 1799.

79a. 硕苞蔷薇 (原变种) 图版 71: 7—9

R. bracteata Wendl. var. **bracteata**

铺散常绿灌木, 高 2—5 米, 有长匍枝; 小枝粗壮, 密被黄褐色柔毛, 混生针刺和腺毛; 皮刺扁弯常成对着生在托叶下方。小叶 5—9, 连叶柄长 4—9 厘米; 小叶片革质, 椭圆形、倒卵形, 长 1—2.5 厘米, 宽 8—15 毫米, 先端截形、圆钝或稍急尖, 基部宽楔形或近圆形, 边缘有紧贴圆钝锯齿, 上面无毛, 深绿色, 有光泽, 下面颜色较淡, 沿脉有柔毛或无毛; 小叶柄和叶轴有稀疏柔毛、腺毛和小皮刺; 托叶大部分离生, 呈篦齿状深裂, 密被柔毛, 边缘有腺毛。花单生或 2—3 朵集生; 直径 4.5—7 厘米; 花梗长不到 1 厘米, 密生长柔毛和稀疏腺毛; 有数枚大型宽卵形苞片, 边缘有不规则缺刻状锯齿, 外面密被柔毛, 内面近无毛; 萼片宽卵形, 先端尾状渐尖, 和萼筒外面均密被黄褐色柔毛和腺毛, 内面有稀疏柔毛, 花后反折; 花瓣白色, 倒卵形, 先端微凹, 心皮多数; 花柱密被柔毛, 比雄蕊稍短。果球形, 密被黄褐色柔毛, 果梗短, 密被柔毛。花期 5—7 月, 果期 8—11 月。

产江苏、浙江、台湾、福建、江西、湖南、贵州、云南。多生于溪边、路旁和灌丛中, 海拔 100—300 米。日本琉球有分布。

果实和根可入药。有收敛、补脾、益肾之效。花可止咳; 叶外敷治疗毒。

温暖地带繁殖容易, 插条、压条均可生根, 栽培作绿篱, 常绿并有密刺, 可以防畜, 满布白花也很美丽。园艺品种有与金樱子杂交成重瓣者, 带果香味。

79b. 密刺硕苞蔷薇 (变种)

R. bracteata Wendl. var. **scabriacaulis** Lindl. ex Koidz. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 24(2):227. 1913; Li, Woody Fl. Taiwan 297. 1963; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:99. 1977.

本变种主要特点是小枝密被针刺和腺毛。

产浙江、福建、台湾。多生溪边或杂木林中。

组 9. 小叶组 — Sect. Microphyllae Crép. in Journ. Hort. Soc. Lond. 11:227. 1889, et in Journ. des Ros. 15:77. 1891; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:337. 1915. — *Rosa* div. *Bracteatae* Lindl. Ros. Monogr. 7. 1820. p. p. — *Rosa* Ser. *Lindleyana* Tratt.