

组 2. 十蕊组——Sect. *Plagiospermum* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 345. 1915.

本组有下列 2 种。

3. **东北扁核木**(东北木本植物图志) 辽宁扁核木(中国树木分类学), 扁胡子(黑龙江), 东北蕤核(拉汉种子植物名称)

Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean in Kew Bull. 1909: 354. 1909, et Trees & Shrubs Brit. Isl. **1**: 223. f. 1914; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 345. 1915; Nakai, Fl. Sylv. Kor. **5**: 44. t. 27. 1916; 陈嵘, 中国树木分类学 484. 1937; Kost. in Kom. Fl. URSS **10**: 583. t. 27. f. 1941; 东北木本植物图志 323. 图版 111. 图 237. 1955; 东北植物检索表 162. 图版 52. 图 7. 1959. ——*Plagiospermum sinense* Oliv. in Hooker's Icon. Pl. **16**: t. 1526. 1886; A. Purpus in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **12**: 1. t. 1903; Kom. in Act. Hort. Petrop. **22**: 554. t. 12. 1904. ——*Prinsepia chinensis* Oliv. ex Kom. in Kom. & Klobulova-Alisova, Key Pl. Far. East. Reg. URSS **2**: 658. 1932.

小灌木, 高约 2 米, 多分枝; 枝条灰绿色或紫褐色, 无毛, 皮成片状剥落; 小枝红褐色, 无毛, 有稜条; 枝刺直立或弯曲, 刺长 6—10 毫米, 通常不生叶; 冬芽小, 卵圆形, 先端急尖, 紫红色, 外面有毛。叶互生, 稀丛生, 叶片卵状披针形或披针形, 极稀带形, 长 3—6.5 厘米, 宽 6—20 毫米, 先端急尖、渐尖或尾尖, 基部近圆形或宽楔形, 全缘或有稀疏锯齿, 上面深绿色, 叶脉下陷, 下面淡绿色, 叶脉突起, 两面无毛或有少数睫毛; 叶柄长 5—10 毫米, 无毛; 托叶小, 膜质, 披针形, 先端渐尖, 全缘, 内面有毛, 脱落。花 1—4 朵, 簇生于叶腋; 花梗长 1—1.8 厘米, 无毛; 花直径约 1.5 厘米; 萼筒钟状, 萼片短三角状卵形, 全缘, 萼筒和萼片外面无毛, 边有睫毛; 花瓣黄色, 倒卵形, 先端圆钝, 基部有短爪, 着生在萼筒口部里面花盘边缘; 雄蕊 10, 花丝短, 成 2 轮着生在花盘上近边缘处; 心皮 1, 无毛, 花柱侧生, 柱头头状。核果近球形或长圆形, 直径 1—1.5 厘米, 红紫色或紫褐色, 光滑无毛, 萼片宿存; 核坚硬, 卵球形, 微扁, 直径约 8—10 毫米, 有皱纹。花期 3—4 月, 果期 8 月。

产黑龙江、吉林、辽宁。生于杂木林中或阴山坡的林间, 或山坡开阔处以及河岸旁。抗寒, 叶芽萌动较早。

果肉质, 有浆汁及香味, 可食。

4. **蕤核**(本草经) 蕤李子(救荒本草), 扁核木(中国树木分类学), 单花扁核木(经济植物手册), 山桃(河南), 马茹(陕西), 茹茹(山西) 图版 1: 4—5

Prinsepia uniflora Batal. in Act. Hort. Petrop. **12**: 167. 1892, et in Gartenfl. **42**: 331. 1892; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 345. 1915; 陈嵘, 中国树木分类学 484. 1937; 中国高等植物图鉴 **2**: 303. 图 2335. 1972.

4a. 蕤核(原变种)

P. uniflora Batal. var. ***uniflora***

灌木, 高 1—2 米; 老枝紫褐色, 树皮光滑; 小枝灰绿色或灰褐色, 无毛或有极短柔毛;