

用,但有些品种的果肉也可干制。甜仁的优良品种,如河北的白玉扁、龙王扁、北山大扁、陕西的迟梆子、克拉拉等。苦仁的优良品种,如河北的西山大扁、冀东小扁等。

3.加工用杏类 果肉厚,糖分多,便于干制。有些甜仁品种,可肉、仁兼用。例如新疆的阿克西米西、克孜尔苦曼提、克孜尔达拉斯等,都是鲜食、制干和取仁的优良品种。

杏的常见栽培供观赏的树种,主要有以下类型: 1.垂枝杏 *f. pendula* (Jäger) Rehd. 枝下垂。2.斑叶杏 *f. variegata* (West.) Zabel 叶有斑彩。

2.山杏(东北木本植物图志) 西伯利亚杏(中国树木分类学),西伯日-归勒斯(蒙语)

Armeniaca sibirica (L.) Lam. Encycl. Méth. Bot. **1**:3. 1783; DC. Prodr. 532. 1825; Kost. in Kom. Fl. URSS **10**:590. pl. 38. f. 4. 1941; 东北木本植物图志 317. 图版110. 图 232. 1955; 俞德浚,中国果树分类学 47. 图 15. 1979. — *Prunus sibirica* L. Sp. Pl. 474. 1753; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**:636. f. 349c. 350g-h. 1906; 陈嵘,中国树木分类学 466. 1937; 中国高等植物图鉴 **2**: 306. 图 2342. 1972; 内蒙古植物志 **3**: 125. 图版 65. 图 1—5. 1977. — *Prunus armeniaca* L. var. *sibirica* (L.) K. Koch, Dendr. **1**:88. 1869; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **29**:86. 1883.

2a. 山杏(原变种) 图版 4: 4—5

A. sibirica (L.) Lam. var. ***sibirica***

灌木或小乔木,高 2—5 米;树皮暗灰色;小枝无毛,稀幼时疏生短柔毛,灰褐色或淡红褐色。叶片卵形或近圆形,长(3)5—10 厘米,宽(2.5)4—7 厘米,先端长渐尖至尾尖,基部圆形至近心形,叶边有细钝锯齿,两面无毛,稀下面脉腋间具短柔毛;叶柄长 2—3.5 厘米,无毛,有或无小腺体。花单生,直径 1.5—2 厘米,先于叶开放;花梗长 1—2 毫米;花萼紫红色;萼筒钟形,基部微被短柔毛或无毛;萼片长圆状椭圆形,先端尖,花后反折;花瓣近圆形或倒卵形,白色或粉红色;雄蕊几与花瓣近等长;子房被短柔毛。果实扁球形,直径 1.5—2.5 厘米,黄色或桔红色,有时具红晕,被短柔毛;果肉较薄而干燥,成熟时开裂,味酸涩不可食,成熟时沿腹缝线开裂;核扁球形,易与果肉分离,两侧扁,顶端圆形,基部一侧偏斜,不对称,表面较平滑,腹面宽而锐利;种仁味苦。花期 3—4 月,果期 6—7 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、河北、山西等地。生于干燥向阳山坡上、丘陵草原或与落叶乔灌木混生,海拔 700—2000 米。蒙古东部和东南部、苏联远东和西伯利亚也有。

本种耐寒(可达 -50°C 低温),又抗旱,可作砧木,是选育耐寒杏品种的优良原始材料。种仁供药用,可作扁桃的代用品,并可榨油。我国东北和华北地区大量生产种仁,供内销和出口。

2b. 毛杏(变种)

A. sibirica (L.) Lam. var. ***pubescens*** Kost. in Kom. Fl. URSS **10**:594. 1941, cum diagn. Rossico. — *Prunus sibirica* L. var. *pubescens* (Kost.) Nakai in Journ. Jap.