

圆形或椭圆状长圆形,先端圆钝或急尖,边常具不明显细小锯齿;花瓣宽倒卵形或近圆形,粉红色或白色;雄蕊多数,与花瓣近等长或稍长;子房密被柔毛。果实近球形,直径1.5—2.6厘米,黄色,有时向阳处具红晕或红点,被短柔毛;果肉稍肉质或干燥,味酸或稍苦涩,果实大的类型可食,有香味;核近球形或宽椭圆形,长13—18毫米,宽11—18毫米,两侧扁,顶端圆钝或微尖,基部近对称,表面微具皱纹,腹棱钝,侧棱不发育,具浅纵沟,背棱近圆形;种仁味苦,稀甜。花期4月,果期5—7月。

产吉林、辽宁。生于开阔的向阳山坡灌木林或杂木林下,海拔400—1000米。苏联远东和朝鲜北部也有分布。

本种耐寒力强,可作栽培杏的砧木,是培育抗寒杏的优良原始材料。木材坚实,纹理美观,可制作各种家具。花可供观赏。种仁供药用和食品工业用。

6b. 光叶东北杏(变种)

Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skv. var. **glabra** (Nakai) Yü et Lu, comb. nov. — *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne var. *glabra* Nakai in Journ. Jap. Bot. 15:679. 1939.

和上述变种区别在于叶片两面均无毛。

产黑龙江、吉林、辽宁。生于低海拔的山地。朝鲜也有。

7. 梅(诗经) 春梅(江苏南通),干枝梅(北京),酸梅,乌梅

Armeniaca mume Sieb. in Verh. Batav. Genoot. Kunst. Wetensch. 12(1):69. 1830; 俞德浚,中国果树分类学 51. 图 17. 1979. — *Prunus mume* Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 1:29. t. 11. 1836; Bailey in Gent. Herb. 1:28. 1920; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 5:211. 1924; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5:87. 1927 et in Brittonia 4:89. 1941; 陈嵘,中国树木分类学 463. 图 357. 1937; 广州植物志 289. 1956; 陈俊愉,园艺学报 1(1): 69 和 1(3—4): 337. 1962; 中国高等植物图鉴 2: 306. 图 2341. 1972. — *Prunus mume* Sieb. et Zucc. *a. typica* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 29:84. 1883.

7a. 梅(原变种) 图版 4: 11—12

A. mume Sieb. var. **mume**

小乔木,稀灌木,高4—10米;树皮浅灰色或带绿色,平滑;小枝绿色,光滑无毛。叶片卵形或椭圆形,长4—8厘米,宽2.5—5厘米,先端尾尖,基部宽楔形至圆形,叶边常具小锐锯齿,灰绿色,幼嫩时两面被短柔毛,成长时逐渐脱落,或仅下面脉腋间具短柔毛;叶柄长1—2厘米,幼时具毛,老时脱落,常有腺体。花单生或有时2朵同生于1芽内,直径2—2.5厘米,香味浓,先于叶开放;花梗短,长约1—3毫米,常无毛;花萼通常红褐色,但有些品种的花萼为绿色或绿紫色;萼筒宽钟形,无毛或有时被短柔毛;萼片卵形或近圆形,先端圆钝;花瓣倒卵形,白色至粉红色;雄蕊短或稍长于花瓣;子房密被柔毛,花柱短或稍长于雄蕊。果实近球形,直径2—3厘米,黄色或绿白色,被柔毛,味酸;果肉与核粘贴;核椭圆