

序,有花 5—10 朵,基部具绿色叶状苞片,花叶同开;总苞片匙状长圆形,长 1—1.5 厘米,上部最宽处 5—6 毫米,外面被稀疏柔毛,边有稀疏暗红色小腺体,花后脱落;花轴密被伏生柔毛;苞片绿色,卵圆形,长 5—7 毫米,宽(4) 5—7 毫米,边有尖锐锯齿,无腺体或腺体不明显;花梗长 0.5—1.5 厘米,密被伏生柔毛;花直径约 1.5 厘米;萼筒倒圆锥状,长 3—4 毫米,先端宽 2.5—3 毫米,外面伏生短柔毛,萼片椭圆三角形,比萼筒稍长或与之近等长,先端通常渐尖,边有疏齿,齿端有不明显的细小腺体或无;花瓣白色,椭圆形,长 6—7 毫米,宽 5—6 毫米;雄蕊约 36 枚;花柱与雄蕊近等长,柱头扩大,头状。核果卵球形,成熟后变黑色,纵径 7—8 毫米,横径 5—6 毫米;核表面有数条显著棱纹。花期 6 月,果期 9 月。

产黑龙江、吉林、辽宁。生于阳坡杂木林中或有腐殖质土石坡上,也见于山地灌丛及草丛中。苏联远东地区、朝鲜和日本均有分布。

本种接近长腺樱桃 *C. claviculata* Yü et Li, 但本种叶边和苞片的腺体极不明显或无腺体,萼筒倒圆锥状,基部不膨大,萼片比萼筒稍长或近等长,可以区别。

6. 雕核樱桃(经济植物手册)

Cerasus pleiocerasus (Koehne) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus pleiocerasus* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 198. 1912; Stapf in Curtis's Bot. Mag: 153: t. 9192. 1930. — *P. tatsienensis* Batal. var. *stenadenia* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1. 201. 1912.

乔木,高 3—7 米,树皮灰褐色。小枝灰褐色,嫩枝淡红褐色或淡红绿色、无毛。冬芽椭圆卵形,无毛。叶片通常卵状长圆形或倒卵状长圆形,长 4—8.5 厘米,宽 2—3.5 厘米,先端渐尖,基部楔形或圆形,边有细锯齿,浅而钝,齿端腺体小圆锥状,上面深绿色,无毛,下面淡绿色,无毛或脉腋有簇毛,侧脉 9—12 对;叶柄长 0.8—2 厘米,无毛,顶端 1—3 枚腺体;托叶卵圆形或卵状椭圆形,边缘有锯齿,齿端有圆锥状腺体。花序近伞房总状,长 4—6 厘米,有 2—9 花,下部常有数枚苞片不孕或无不孕苞片;总苞片褐色,倒卵状椭圆形,长 4—8 毫米,宽 4—5 毫米,边有圆锥状腺齿;花轴无毛;苞片宽卵形,长宽近相等或长略甚于宽,直径 2—5 毫米,边有圆锥状腺体;花梗长 1—1.5 厘米,无毛,萼筒钟状,长 3—4 毫米,上面最宽处 3—4 毫米,外面无毛,萼片三角形或三角状披针形,先端渐尖,边有圆锥状腺体;花瓣白色,近圆形;雄蕊 30—34;花柱比雄蕊稍长,柱头稍扩大呈小盘状。核果红色或黑色,球形,纵径长 7—8 毫米,横径长约 7 毫米,核表面有显著棱纹。花期 6—7 月,果期 8—9 月。

产四川西部、云南北部。生于山坡林中,海拔 2000—3400 米。模式标本采自四川汶川。

本种与锥腺樱桃 *C. conadenia* (Koehne) Yü et Li 相近,不同在于叶片通常狭长,叶边锯齿浅而钝,花序上苞片通常较小,可以区别。

组 2. 伞形组——Sect. *Phyllocerasus* (Koehne) Yü et Li, stat. nov.——Sect. 1. *Cremostosepulum* Koehne Subset. *Phyllocerasus* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 238. 1912.

本组有下列 4 种。

7. 康定樱桃 图版 7: 6—7

Cerasus tatsienensis (Batal.) Yü et Li, comb. nov.——*Prunus tatsienensis* Batal. in Act. Hort. Petrop. 14: 322. 1895.

灌木或小乔木,高 2—5 米,树皮灰褐色。小枝灰色,嫩枝绿色,被疏柔毛或无毛。冬芽卵圆形,无毛。叶片卵形或卵状椭圆形,长 1—4.5 厘米,宽 1—2.5 厘米,先端渐尖,基部圆形,边有重锯齿,齿端有小腺体,上面绿色,几无毛,下面淡绿色,无毛或脉腋有簇毛,侧脉 6—9 对;叶柄长 0.8—1 厘米,无毛或被疏柔毛,顶端有腺或无腺体;托叶椭圆披针形或卵状披针形,边有锯齿,齿端有盘状腺体。花序伞形或近伞形,有花 2—4 朵,花叶同开;总苞片紫褐色,匙形,长约 8 毫米,宽约 4 毫米,外面无毛或被疏长毛,总梗长 5—12 毫米,无毛或被疏柔毛;苞片绿色,果实宿存,椭圆形或近圆形,直径 3—5 毫米,边缘齿端有盘状腺体;总梗长 1—2 厘米,无毛,花直径约 1.5 厘米;萼筒钟状,长 3—4 毫米,宽 2—3 毫米,无毛,萼片卵状三角形、先端急尖或钝,全缘或有疏齿,长约为萼筒的一半;花瓣白色或粉红色,卵圆形;雄蕊 20—35 枚;花柱与雄蕊近等长,柱头头状。花期 4—6 月。

产山西、陕西、河南、湖北、四川、云南。生于林中,海拔 900—2600 米。模式标本采自四川康定。

本种与微毛樱桃 *C. clarifolia* (Schneid.) Yü et Li 相近,惟本种苞片边缘腺体呈盘状,可以区别。

8. 迎春樱桃 图版 8: 1—4

Cerasus discoidea Yü et Li 植物分类学报 23(3): 211. 1985.

小乔木,高 2—3.5 米,树皮灰白色。小枝紫褐色,嫩枝被疏柔毛或脱落无毛。冬芽卵球形,无毛。叶片倒卵状长圆形或长椭圆形,长 4—8 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端骤尾尖或尾尖,基部楔形,稀近圆形,边有缺刻状急尖锯齿,齿端有小盘状腺体,上面暗绿色,伏生疏柔毛,下面淡绿色,被疏柔毛,嫩时较密,侧脉 8—10 对;叶柄长 5—7 毫米,幼时被稀疏柔毛,以后脱落几无毛,顶端有 1—3 腺体;托叶狭带形,长 5—8 毫米,边缘有小盘状腺体。花先叶开放或稀花叶同开,伞形花序有花 2 朵,稀 1 或 3 朵,基部常有褐色革质鳞片;总苞片褐色,倒卵状椭圆形,长 3—4 毫米,宽 2—3 毫米,外面无毛,内面伏生疏柔毛,顶端有齿裂,边缘有小头状腺体;总梗长 3—10 毫米,被稀疏柔毛或无毛,内藏于革质鳞片内或微伸出;苞片革质,绿色,近圆形,直径 2—4 毫米,边有小盘状腺体,几无毛;花梗长 1—1.5 厘米,被稀疏柔毛;萼筒管形钟状,长 4—5 毫米,宽 2—3 毫米,外面被稀疏柔毛,萼片长圆形,长 2—3 毫米,先端圆钝或有小尖头;花瓣粉红色;长椭圆形,先端二裂;雄蕊 32—40;