

毛;总梗长 0.8—2 厘米,无毛或散生疏柔毛;苞片圆形,直径 3—5 毫米,边有长柄腺体;花梗长 1.5—2.6 厘米,无毛或被稀疏柔毛;萼筒钟状,长 4 毫米,无毛,萼片反折,披针形,先端圆钝,比萼筒长近 1.5—2 倍;花瓣粉红色,长圆形,先端 2 裂;雄蕊约 32 枚,稍短于花瓣;花柱比雄蕊稍长,无毛。核果红色,近球形,直径 7.5—8.3 毫米;核略具稜纹。花期 4 月,果期 5—6 月。

产湖北、四川、湖南、广东、广西。生于山地疏林中,海拔 1000—1300 米。模式标本采自湖北西部。

14b. 双花山樱桃(变种)

C. cyclamina (Koehne) Yü et Li var. **biflora** (Koehne) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus cyclamina* Koehne var. *biflora* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 243. 1912.

本变种与原变种区别主要在于叶片宽椭圆形,侧脉 8—10 对,无毛,伞形花序仅有 2 花。花期 5 月,果期 6—7 月。

产四川、湖南。生于灌木林中,海拔 1300 米。模式标本采自峨眉山。

15. 尾叶樱桃 尾叶樱(经济植物手册)

Cerasus dielsiana (Schneid.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus dielsiana* Schneid. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 1: 68. 1905; Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 243. 1912; 陈嵘, 中国树木分类学 474. 1937; 中国高等植物图鉴 2: 309. 图 2347. 1972; 湖北植物志 2: 229. 图 1051. 1979. — *Prunus dielsiana* Schneid. var. *laxa* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 208. 1912. — *Prunus dielsiana* var. *conferta* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 244. 1912.

15a. 尾叶樱桃(原变种) 图版 8: 5—9

C. dielsiana var. **dielsiana**

乔木或灌木,高 5—10 米。小枝灰褐色,无毛,嫩枝无毛或密被褐色长柔毛。冬芽卵圆形,无毛。叶片长椭圆形或倒卵状长椭圆形,长 6—14 厘米,宽 2.5—4.5 厘米,先端尾状渐尖,基部圆形至宽楔形,叶边有尖锐单齿或重锯齿,齿端有圆钝腺体,上面暗绿色,无毛,下面淡绿色,中脉和侧脉密被开展柔毛,其余被疏柔毛,有侧脉 10—13 对;叶柄长 0.8—1.7 厘米,密被开展柔毛,以后脱落变疏,先端或上部有 1—3 枚腺体;托叶狭带形,长 0.8—1.5 厘米,边有腺齿。花序伞形或近伞形,有花 3—6 朵,先叶开放或近先叶开放;总苞褐色,长椭圆形,内面密被伏生柔毛;总梗长 0.6—2 厘米,被黄色开展柔毛;苞片卵圆形,直径 3—6 毫米,边缘撕裂状,有长柄腺体;花梗长 1—3.5 厘米,被褐色开展柔毛;萼筒钟形,长 3.5—5 毫米,被疏柔毛,萼片长椭圆形或椭圆披针形,约为萼筒的 2 倍,先端急尖或钝,边有缘毛;花瓣白色或粉红色,卵圆形,先端 2 裂;雄蕊 32—36,与花瓣近等长,花柱比雄蕊稍短或较长,无毛。核果红色,近球形,直径 8—9 毫米;核卵形表面较光滑。花期 3—4 月。

产江西、安徽、湖北、湖南、四川、广东、广西。生于山谷、溪边、林中,海拔 500—900