

米。模式标本采自湖北。

本种与襄阳山樱桃 *C. cyclamina* (Koehne) Yü et Li 很近似,但本种叶柄、叶片下面、花梗、萼筒均被开展长柔毛,花先叶开放,稀稍先开放或近同开,可以区别。

15b. 短梗尾叶樱桃(变种)

C. dielsiana (Schneid.) Yü et Li var. **abbreviata** (Card.) Yü et Li, comb. nov.
—*Prunus dielsiana* var. *abbreviata* Card. in Lecomte, Not. Syst. 4: 29. 1920.

本变种不同于原变种在于总梗极短或近无总梗,从宿存的总苞中伸出 2(3) 花,稀更多。花期 3 月。

产四川(南川)、贵州。生于林中,海拔 1250 米。

16. 光叶樱桃

Cerasus glabra (Pamp.) Yü et Li, comb. nov.—*Prunus hirtipes* Hemsl. var. *glabra* Pamp. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. 17: 293. 1910. —*Prunus glabra* (Pamp) Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 241. 1912.

乔木,高 3—5 米。小枝灰褐色,无毛。冬芽卵圆形,无毛。叶片椭圆形或椭圆卵形,长 4.5—9 厘米,宽 2.5—3.5 厘米,先端尾尖,基部圆形,稀宽楔形,边有尖锐锯齿,齿端有小腺体,上面深绿色,下面淡绿色,两面均无毛,侧脉 6—8 对;叶柄长 1.2—1.7 厘米,无毛;托叶线形,长 8—10 毫米,边有腺齿。花序伞形,有花 2—4 朵,花先叶开放或近同开;总苞片褐色,倒卵状椭圆形,长约 7 毫米,宽约 5 毫米,外面无毛,内面伏生疏柔毛;几无总梗;苞片小,淡褐色,长约 2 毫米,边有腺齿;花梗长 2—2.5 厘米,无毛;萼筒钟状,长约 4 毫米,宽约 3 毫米,外面无毛,萼片三角形,长约 2.5 毫米,先端钝,边全缘,比萼筒短,开花后反折;花瓣白色,长圆形,先端二裂,雄蕊 36—54,短于花瓣;花柱无毛,与雄蕊近等长,柱头扩大。核果几球形,直径约 8 毫米;核表面略具棱纹。花期 3 月,果期 5 月。

产湖北、四川。分布较稀少,海拔 600—1300 米。模式标本采自湖北。

本种与崖樱桃 *C. scopulorum* (Koehne) Yü et Li 接近,但本种伞形花序几无总梗,叶柄及花序均无毛,可以区别。

17. 浙闽樱桃 图版 8: 10—13

Cerasus schneideriana (Koehne) Yü et Li, comb. nov.—*Prunus schneideriana* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 242. 1912.

小乔木,高 2.5—6 米。小枝紫褐色,嫩枝灰绿色,密被灰褐色微硬毛。冬芽卵圆形,无毛。叶片长椭圆形、卵状长圆形或倒卵状长圆形,长 4—8 厘米,宽 1.5—4.5 厘米,先端渐尖或骤尾尖,基部圆形或宽楔形,边缘锯齿渐尖,常有重锯齿,齿端有头状腺体,上面深褐色,近无毛,下面灰绿色,被灰黄色微硬毛,脉上较密,侧脉 8—11 对;叶柄长 5—8 毫米,密被褐色微硬毛,先端有 2(3) 枚黑色腺体;托叶褐色,膜质,长 4—7 毫米,边缘疏生长柄腺体,

早落。花序伞形,通常2朵,稀1或3朵;总苞长圆形,先端圆钝;花梗长1.8—3.8毫米,被毛;苞片绿褐色,边有锯齿,齿端腺体锥状,有柄;花梗长1—1.4厘米,密被褐色微硬毛;萼筒筒状,长3—4毫米,宽2—3毫米,伏生褐色短柔毛,萼片反折,带状披针形,与萼筒近等长,先端圆钝;花瓣卵形,先端二裂;雄蕊约40枚,短于花瓣;花柱比雄蕊短,基部及子房疏生微硬毛。核果紫红色,长椭圆形,纵径8毫米,横径约5毫米,表面有稜纹。花期3月,果期5月。

产浙江、福建、广西。生于林中,海拔600—1300米。模式标本采自浙江宁波。

本种与短柄尾叶樱桃 *C. dielsiana* (Schneid.) Yü et Li var. *abbreviata* (Card) Yü et Li 接近,不同在于本种萼片与萼筒近等长,花柱被毛,可以区别。

18. 櫻桃(名医别录) 莺桃(本草纲目),荆桃(尔雅),楔桃(广雅),英桃、牛桃(博物志),櫻珠(江苏) 图版9: 1—2

Cerasus pseudocerasus (Lindl.) G. Don in London, Hort. Brit. 200. 1830; 俞德浚,中国果树分类学 65,图 22. 1979. — *Prunus pseudocerasus* Lindl. in Trans. Hort. Soc. Lond. 6: 90. 1852; 陈嵘,中国树木分类学 472. 图 366. 1973; 裴鉴等,江苏南部种子植物手册 343. 图 545. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 312. 图 2353. 1972; 秦岭植物志 1(2): 586. 1974. — *Prunus pauciflora* Bge. in Mem. Acad. Sci. St.-Petersb. Sav. Etrang. 2: 97. 1835. — *Prunus involucrata* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 206. 1912. — *Prunus paniculata* auct. non Thunb; Ker, Bot. Reg. 10: t. 800. 1824. exclud. descr.


乔木,高2—6米,树皮灰白色。小枝灰褐色,嫩枝绿色,无毛或被疏柔毛。冬芽卵形,无毛。叶片卵形或长圆状卵形,长5—12厘米,宽3—5厘米,先端渐尖或尾状渐尖,基部圆形,边有尖锐重锯齿,齿端有小腺体,上面暗绿色,近无毛,下面淡绿色,沿脉或脉间有稀疏柔毛,侧脉9—11对;叶柄长0.7—1.5厘米,被疏柔毛,先端有1或2个大腺体;托叶早落,披针形,有羽裂腺齿。花序伞房状或近伞形,有花3—6朵,先叶开放;总苞倒卵状椭圆形,褐色,长约5毫米,宽约3毫米,边有腺齿;花梗长0.8—1.9厘米,被疏柔毛;萼筒钟状,长3—6毫米,宽2—3毫米,外面被疏柔毛,萼片三角卵圆形或卵状长圆形,先端急尖或钝,边缘全缘,长为萼筒的一半或过半;花瓣白色,卵圆形,先端下凹或二裂;雄蕊30—35枚,栽培者可达50枚;花柱与雄蕊近等长,无毛。核果近球形,红色,直径0.9—1.3厘米。花期3—4月,果期5—6月。

产辽宁、河北、陕西、甘肃、山东、河南、江苏、浙江、江西、四川。生于山坡阳处或沟边,常栽培,海拔300—600米。

本种在我国久经栽培,品种颇多,供食用,也可酿樱桃酒。枝、叶、根、花也可供药用。

19. 崖櫻桃(秦岭植物志)

Cerasus scopulorum (Koehne) Yü et Li, comb. nov. — *prunus scopulorum* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1:241, 1912; 秦岭植物志 1(2): 586. 图481. 1974; 湖北植物志 2,



1—4. 迎春樱桃 *Cerasus discoidea* Yü et Li: 1. 果枝, 2. 苞片, 3. 盘状腺体, 4. 花纵剖面。
 5—9. 尾叶樱桃 *Cerasus dielsiana* (Schneid.) Yü et Li: 5. 花序 6—7. 苞片, 8. 花瓣, 9. 叶片。
 10—13. 浙闽樱桃 *Cerasus schneideriana* (Koehne) Yü et Li: 10. 花序, 11. 苞片, 12. 锥状腺体, 13. 花瓣。(刘春荣绘)