

229. 图 1052. 1979.

乔木, 高达 3—8 米, 树皮红褐色。小枝灰褐色, 被短柔毛或疏柔毛。冬芽长椭圆形, 无毛或微被毛。叶片长椭圆形或卵状椭圆形, 长 5—11 厘米, 宽 3—6 厘米, 先端尾尖或骤尾尖, 基部近圆形, 边有不整齐单锯齿, 稀重锯齿, 齿端有小腺体, 上面近深绿色, 无毛, 下面淡绿色, 脉上被疏柔毛, 以后脱落无毛; 叶柄长 5—12 毫米, 无毛; 托叶狭带形, 比叶柄短, 边有腺齿, 早落。花序伞形, 有花 3—7 朵, 先叶开放; 总苞片褐色, 倒卵状长圆形, 长约 8 毫米, 宽约 5 毫米, 外面被稀疏柔毛, 内面密被伏生长柔毛; 总梗长 2—9 毫米, 被疏柔毛; 苞片小, 长 1—2.5 毫米, 边有缺刻状锯齿, 早落。花梗长 1—2 厘米, 疏被长柔毛; 萼筒管形钟状, 长 6—7 毫米, 宽 3—4 毫米, 外面伏生疏毛, 萼片卵圆形, 长 2—3 毫米, 先端圆钝或急尖, 边全缘, 有缘毛, 开花后反折; 花瓣白色, 长椭圆形, 先端二裂; 雄蕊 34—48 枚; 花柱与雄蕊近等长, 无毛。核果红色, 卵球形, 长约 1.2 厘米; 核表面略具稜纹。 花期 3 月, 果期 5 月。

产陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。生于山谷林中, 海拔 700—1200 米。模式标本采自湖北西部。

20. 西南樱桃

Cerasus duclouxii (Koehne) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus duclouxii* Koehne in Sarg. Pl. Wils 1:242. 1912.

乔木或灌木, 高约 4 米。小枝灰色或灰褐色, 被稀疏柔毛或无毛。冬芽长卵形, 无毛。叶片倒卵椭圆形或椭圆形, 长 3.5—5 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 先端骤尖, 基部圆形或楔形, 边有尖锐锯齿, 齿端有小腺体, 上面绿色, 疏被短毛或无毛, 下面淡绿色, 疏被柔毛或仅脉腋有簇毛, 侧脉 7—9 对; 叶柄长 0.8—1 厘米, 疏被短毛或无毛; 托叶线形, 边有腺齿。花序近伞形, 有花 3—5 朵, 先叶开放, 下部有褐色革质鳞片包被, 果时脱落; 总苞椭圆形, 长 3.5—4 毫米, 宽 2—3 毫米, 外面无毛, 内面密被柔毛; 总梗长 0—3 毫米, 密被开展柔毛; 苞片很小, 长约 1 毫米, 边有腺齿; 花梗长 3—4 毫米, 从总苞中伸出, 密被短柔毛; 萼筒钟状, 长 3—4 毫米, 宽 2—3 毫米, 被短柔毛, 萼片卵状三角形, 先端圆钝, 外被柔毛, 边缘有稀疏腺点; 花瓣白色, 卵形, 先端下凹, 稀不明显; 雄蕊约 33 枚; 花柱与雄蕊近等长, 基部有稀疏柔毛。核果卵球形或椭圆形, 纵径长 7—8 毫米, 横径长 5—6 毫米; 核表面略有稜纹。 花期 3 月, 果期 5 月。

产四川、云南。生于山谷林中或有栽培, 海拔达 2300 米。模式标本采自云南昆明。

本种总梗极短, 开花时被包藏在革质的鳞片内, 花较小, 花柱基部或多或少有毛, 可与崖樱桃 *C. scopulorum* (Koehne) Yü et Li 相区别。在叶和外形上与细花樱桃 *C. pusilliflora* (Card.) Yü et Li 相似, 但后者花梗完全无毛, 花瓣先端大多不下凹, 稍微下凹, 可以区别。

组 5. 小苞组——Sect. *Pseudomahaleb* (Koehne) Yü et Li, stat. nov. — Sect. 1. *Cremastosepalum* Koehne Subsect. *Pseudomahaleb* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1:239. 1912.

本组有下列 3 种。

21. 云南樱桃 (拉汉种子植物名称)

Cerasus yunnanensis (Franch.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus yunnanensis* Franch. Pl. Delav. 195. 1889; Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1:239. 1912.

21a. 云南樱桃(原变种) 图版 10: 1—2

C. yunnanensis* var. *yunnanensis

乔木, 高 4—8 米, 树皮灰色。小枝灰褐色, 无毛, 嫩枝绿色, 被微硬毛, 早期脱落。冬芽卵圆形, 无毛。叶片长圆形、倒卵长圆形或卵状长圆形, 通常长 4—6 厘米, 宽 2—3 厘米, 先端渐尖, 基部圆形, 边有尖锐锯齿间有少数重锯齿, 顶端有头状小腺体, 上面暗绿色, 疏被柔毛或以后脱落几无毛, 下面淡绿色, 幼时被微硬毛, 脉上较密, 以后脱落稀疏, 或除脉上外其余脱落几无毛, 侧脉 9—14 对; 叶柄长 6—12 毫米, 被微硬毛或脱落几无毛, 先端有 2 圆形腺体; 托叶狭带形, 与叶柄近等长或稍短, 边有腺齿, 不久脱落。花序近伞房总状, 长 3.5—7 厘米, 有花 3—5(7) 朵, 花叶同开或近先叶开放; 花轴被微硬毛; 总苞片褐色, 匙状长圆形或倒卵长圆形, 长 7—12 毫米, 先端圆钝, 边有腺齿, 两边被疏柔毛, 开花后期脱落; 总梗长 5—10 毫米, 密被硬毛; 苞片褐色或带绿色, 膜质或革质, 卵形或倒卵形, 直径 2—3 毫米, 边有腺齿; 花梗长 0.5—2 厘米, 微被硬毛; 花直径约 1.5 厘米; 萼筒管形钟状, 长 3—5 毫米, 上部最宽处 3—4 毫米, 密被微硬毛, 萼片反折, 卵形, 先端圆钝, 约为萼筒长的一半或不到一半; 花瓣白色, 近圆形, 先端微波状; 雄蕊 38—45, 与花瓣近等长; 花柱基部被疏柔毛。核果紫红色, 卵球形, 纵径 7—10 毫米, 横径 7—8 毫米; 核表面微有稜纹; 果梗长 10—15 毫米, 密被硬毛。花期 3—5 月, 果期 5—6 月。

产云南、四川、广西。生于山谷林中或山坡地边, 海拔 2300—2600 米。模式标本采自云南西北部碧芝罗。

21b. 多花云南樱桃(变种)

C. yunnanensis (Franch.) Yü et Li var. ***polybotrys*** (Koehne) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus yunnanensis* Franch. var. *polybotrys* Koehne in Fedde, Repert. Nov. Sp. 11: 525. 1913.

总状花序较长, 多花, 5—9 朵, 总苞花后宿存。花期 5 月。

产云南。生于山坡地边, 海拔 2300—2500 米。

22. 蒙自樱桃 图版 10: 3

Cerasus henryi (Schneid.) Yü et Li, Comb. nov. — *Prunus yunnanensis* Franch. var. *henryi* Schneid. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 1:66. 1905. p. p. — *Prunus henryi*