

无毛。叶片卵形、倒卵形或卵状椭圆形,长2—5厘米,宽1—2.5厘米,先端尾状渐尖或骤尖,基部圆形,边有圆钝重锯齿,齿尖有小腺体,上面绿色,伏生小糙毛,下面浅绿色,沿脉被稀疏柔毛,脉腋有簇毛,侧脉6—8对;叶柄长4—8毫米,无毛;托叶卵状长圆形或倒卵状披针形,长4—8毫米,宽1.5—3毫米,边有腺齿。花序伞形,有花2—3朵,花叶同开;总苞褐色,匙形,长约5毫米,宽约1.5毫米,边有腺体,内面被柔毛,早落;总梗长5—7毫米,无毛;苞片2—3片,绿色,呈叶状,卵圆形,长5—20毫米,边有锯齿,齿端有腺体,两面疏被糙毛;花梗长8—12毫米,被疏柔毛或无毛;花直径6—8毫米;萼筒管状,长5—6毫米,宽3—4毫米,外面疏被糙毛,萼片开展,三角状长卵形,长2—3毫米,两面均被稀疏柔毛,先端急尖,边有疏齿;花瓣倒卵形或近圆形,粉红色;雄蕊30—40,与萼片近等长或短于萼片;花柱比雄蕊略长或与雄蕊近等长,中部以下被疏柔毛。核果红色,卵状椭圆形,纵径约8毫米,横径约6毫米;核表面略有稜纹。花期4—6月,果期6—8月。

产陕西、甘肃、四川、贵州。生于山坡、山谷林中或灌木丛中,海拔1300—2600米。模式标本采自甘肃卓尼。

本种叶片卵形、倒卵形或卵状椭圆形,边缘锯齿圆钝,2—3朵花组成伞形花序,基部有2—3叶状苞片,通常总花梗长5—7毫米,易于识别。

26. 尖尾櫻桃 尖尾櫻(拉汉种子植物名称)

Cerasus caudata (Franch.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus caudata* Franch. Pl. Delav. 196. 1890.

乔木,高约6米,树皮灰色。小枝紫褐色,嫩枝密被锈色柔毛。冬芽卵圆形,鳞片外面被疏柔毛。叶片卵圆形、卵状椭圆形或卵状披针形,长2—6.5厘米,宽1.5—3厘米,先端尾尖或渐尖,基部楔形,稀近圆形,边有圆钝重锯齿,齿端有小腺体,上面暗绿色,无毛或被短柔毛,下面淡绿色,被锈色柔毛或除中脉之外其余无毛,侧脉6—9对;叶柄长约5毫米,被开展锈色柔毛;托叶线形,长约6—7毫米,边有腺体。花单生或2—3朵成近伞形花序,花叶同开;总花梗长3—14毫米,被锈色柔毛;苞片小,直径2—3毫米,边有腺齿;花梗长5—25毫米,被锈色柔毛;萼筒管状,长约5毫米,外被锈色柔毛,萼片卵状三角形,长2—3毫米,先端急尖,边有腺齿;花瓣白色,卵圆长圆形比萼片长约一倍;雄蕊约25;花柱和子房无毛。核果红色,椭圆形,纵径1.3—1.5厘米,横径约1厘米;核表面有显著稜纹。花期5月,果期7月。

产云南。生于山坡林下、林缘或草坡,海拔3000—3200米。模式标本采自洱源。

本种 Franchet 发表时,记载叶片除中脉外两面无毛,花梗极短,根据现有标本看来,花梗和总梗长短、叶上下两面被毛否及疏密程度均有变化。

27. 托叶櫻桃(秦岭植物志) 托叶櫻(经济植物手册) 图版11: 3

Cerasus stipulacea (Maxim.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus stipulacea* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. -Petersb. 29:97. 1883; 秦岭植物志 1(2): 587. 1974.