

被短茸毛。叶片倒卵状椭圆形,通常长2—4厘米,宽1—2.5厘米,中部以上最宽,先端圆形或急尖,基部楔形,边有单锯齿或重锯齿,上面深绿色、无毛或被短柔毛,常有皱纹,下面淡绿色,密被褐色微硬毛,网脉明显突出,侧脉5—8对;叶柄通常长2—3毫米,密被短柔毛;托叶线形,长3—4毫米,边有腺齿。花单生或2—3朵簇生,先叶开放;花梗长4—8毫米,密被短柔毛;萼筒钟状,长宽近相等,约3毫米,外被短柔毛,萼片卵形,长约3毫米,先端急尖;花瓣粉红色或白色,倒卵形;雄蕊30—35;花柱与雄蕊近等长,无毛。核果球形,红色,直径1—1.5厘米;核除棱背两侧外,无棱纹。花期4—5月,果期7—9月。

产河北、山西、陕西、河南、甘肃、宁夏。生于山坡阳处灌丛中或荒草地上,常有栽培,海拔400—1600米。

种仁及根皮供药用,宁夏地区常作郁李仁用。

本种与欧李 *C. humilis* (Bge.) Sok. 相近,但本种叶片先端大多圆钝或急尖,叶片下面密被短柔毛,网脉十分显著,小枝、叶柄、花梗和萼筒密被短柔毛,可以区别。

41. 欧李(中国树木分类学) 乌拉奈(辽宁),酸丁(热河志) 图版14: 1—3

*Cerasus humilis* (Bge.) Sok., Gep. Kyt. CCCP 3:751. 1954; 俞德浚, 中国果树分类学 76. 图 28. 1979. — *Cerasus humilis* (Bge.) Bar. et Lion, 东北木本植物图志 327. 图版 112: 242. 1955. — *Prunus humilis* Bge. in Mem. Acad. Sci. St.-Petersb. Sav. Etrang. 2:97. 1835; 中国高等植物图鉴 2: 310. 图 2349. 1972; 内蒙古植物志 3: 129. 1977. — *Prunus japonica* Thunb. var. *salicifolia* Kom. in Act. Hort. Petrop. 22:754. 1904. — *Prunus glandulosa* Thunb. var. *salicifolia* (Kom.) Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1:265. 1912.

灌木,高0.4—1.5米。小枝灰褐色或棕褐色,被短柔毛。冬芽卵形,疏被短柔毛或几无毛。叶片倒卵状长椭圆形或倒卵状披针形,长2.5—5厘米,宽1—2厘米,中部以上最宽,先端急尖或短渐尖,基部楔形,边有单锯齿或重锯齿,上面深绿色,无毛,下面浅绿色,无毛或被稀疏短柔毛,侧脉6—8对;叶柄长2—4毫米,无毛或被稀疏短柔毛;托叶线形,长5—6毫米,边有腺体。花单生或2—3花簇生,花叶同开;花梗长5—10毫米,被稀疏短柔毛;萼筒长宽近相等,约3毫米,外面被稀疏柔毛,萼片三角卵圆形,先端急尖或圆钝;花瓣白色或粉红色,长圆形或倒卵形;雄蕊30—35枚;花柱与雄蕊近等长,无毛。核果成熟后近球形,红色或紫红色,直径1.5—1.8厘米;核表面除背部两侧外无棱纹。花期4—5月,果期6—10月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、河南。生于阳坡砂地、山地灌丛中,或庭园栽培,海拔100—1800米。

种仁入药,作郁李仁,有利尿、缓下作用,主治大便燥结、小便不利。果味酸可食。

本种喜较湿润环境,耐严寒,在肥沃的砂质壤土或轻粘壤土种植为宜。种子繁殖,也可分根繁殖。

42. 麦李(中国树木分类学) 图版14: 5



1—3. 欧李 *Cerasus humilis* (Bge.) Sok.: 1. 果枝, 2. 花枝, 3. 花纵剖面。4. 毛叶欧李 *Cerasus dictyoneura* (Diels) Yü et Li: 叶片背面。5. 麦李 *Coasus glandulosa* Lois: 叶片背面。(刘春荣绘)