

2.5—3 毫米,无毛,萼片椭圆形,比萼筒略长,先端圆钝,边有细齿;花瓣白色或粉红色,倒卵状椭圆形;雄蕊约 32;花柱与雄蕊近等长,无毛。核果近球形,深红色,直径约 1 厘米;核表面光滑。花期 5 月,果期 7—8 月。 $2n = 16$ 。

产黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、浙江。生于山坡林下、灌丛中或栽培,海拔 100—200 米。日本和朝鲜也有分布。

种仁入药,名郁李仁。郁李、郁李仁酊剂有显著降压作用。

本种喜阳耐严寒,抗旱抗湿力均强,一般土地均可栽植,以分株繁殖为主,也可压条。

43b. 长梗郁李(东北木本植物图志) 中井郁李

C. japonica (Thunb.) Lois. var. **nakaii** (Lévl.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus nakaii* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 7: 198. 1908. — *Prunus japonica* Thunb. var. **nakaii** (Lévl.) Rehd. in Jouen. Arn. Arb. 3: 29. 1921. — *Cerasus nakaii* (Lévl.) Bar. et Liou, 东北木本植物图志 328. 图版 113: 244. 1955; 俞德浚, 中国果树分类学 79. 1979.

本变种与原变种主要不同在于,花梗较长,1—2 厘米,叶片卵圆形,叶边锯齿较深,叶柄较长,3—5 毫米。花期 5 月,果期 6—7 月。

产黑龙江、吉林、辽宁。生于山地向阳山坡。朝鲜也有分布。

Koehne 根据营养枝曾发表一新种命名为 *P. carcharis* Koehne in Sarg. Pl. Wils 1: 267. 1912, 产四川南川,系 A. von Rosthorn 1891 年采。我们根据模式照片看,不应属于矮生樱桃类,似应属于典型樱桃类。

其主要特点为叶形近似郁李和长梗郁李,但小枝密被黄褐色硬毛。叶片卵形,卵状长圆形或卵状披针形,长 7—8 厘米,宽 3—4 厘米,先端长尾尖或渐尖,基部圆形稀近心形,叶边有由 2—5 小齿组成缺刻状重锯齿,上面伏生疏柔毛,下面密被黄褐色硬毛,侧脉 10—11 对;叶柄长 6—8 毫米,密被黄褐色硬毛;托叶长 1.2 厘米,羽状或掌状分裂,裂片狭长,边有长柄腺体,永存。

我们尚未看到上列标本,志此留待考证。

组 11. 管萼组——Sect. *Amygdalocerasus* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 268. 1912

本组有下列 2 种。

44. 毛樱桃(河北习见树木图说) 山樱桃(名医别录),梅桃(中国树木分类学),山豆子(河北),樱桃(东北) 图版 15: 1—2

Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. Cat. no. 715. 1829. nom.; Hook. f. Fl. Brit. India 2: 314. 1878. pro. syn.; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 362. 图版 112: 240. 1955; 俞德浚, 中国果树分类 73. 图 27. 1979. — *Prunus tomentosa* Thunb. Gl. Jap. 203. 1784; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 345. 图 549. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 313. 图 2355.