

产广东、广西。生于低海拔的山麓或沿溪疏密林中。越南也有。模式标本采自广西。

C. Kalkman 在 *Blumea* **13**(1):99. 1965 中把此种列为 *Prunus arborea* (Bl.) Kalkm. var. *montana* (Hook. f.) Kalkm. 的异名。据原始文献和我国华南地区标本观察,疏花臀果木和喜马拉雅山区产的 *Py. montanum* Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* **2**:321. 1878 可以区分,后者产于锡金,叶片长圆状披针形,下面老时仍被褐色柔毛,侧脉 10—12 对;花瓣卵状披针形,被柔毛;雄蕊 12—15;子房密被柔毛,故暂不与合并。

和此种相近者有 *Pygeum griseum* Bl. ex Muell. in Walp. *Ann.* **4**:642. 185 *Prunus grisea* (Bl. ex Muell.) Kalkm., *Blumea* **13**(1): 56. 1965. 据记载,此种分布到我国台湾,其特征如下:乔木高达 40 米;枝幼时微被柔毛,迅速无毛。叶草质或多少革质,椭圆形至长圆形或卵圆形至披针形,长 5—20 厘米,宽 2.5—9 厘米,先端长渐尖,基部楔形,无毛或下面脉上具柔毛,基部常有 2,稀具 4 基腺;叶柄长约 5 毫米,具柔毛。总状花序腋生,单生或簇生,长 1.5—6.5 厘米;花梗长 1—7 毫米;花萼外被柔毛;花被片 6—13,通常为 10 枚;萼片常 5,长达 2 毫米;花瓣 5,白色,几与萼片相等;雄蕊约 25;子房无毛,有时具柔毛。果实近球形、扁球形至横向长圆形,长 6—13 毫米,宽 8—16 毫米,红色,无毛或微具柔毛。据刘棠瑞和苏鸿杰在 *Flora of Taiwan* **3**:84. 1977 中记述,此种仅见于台湾兰屿岛,名为兰屿野樱花。从形态征状观察,它和疏花臀果木不易区分,是否同物异名,待今后见到标本后再确定。


6. 大果臀果木 图版 21: 9—10

Pygeum macrocarpum Yü et Lu, 植物分类学报 **23**(3): 213. 图版 2. 图 2. 1985.

小乔木,高 8—10 米;小枝紫褐色至暗灰褐色,具多数明显皮孔,幼时被褐色柔毛,老时无毛。叶片纸质至近革质,椭圆形或长圆状椭圆形,长 10—18 厘米,宽 5—9 厘米,先端突然狭缩成短尖头,基部圆形,全缘,上面绿褐色,下面色较浅,成熟叶片上面无毛,下面沿叶脉具稀疏褐色柔毛,近基部无或有 2 枚扁平腺体,侧脉 6—8 对,在下面明显突起;叶柄长 10—12 毫米,幼时具柔毛,成长时脱落;托叶早落。总状花序单生或 2—3 个簇生于叶腋,总花梗、花梗和花萼均被褐色柔毛;苞片早落。果实扁卵球形,长 15—18 毫米,宽几与长相似或宽稍大于长,紫褐色,无毛,顶端具急尖头,成熟时有时开裂;种子具浓杏仁香味。果期冬季至翌年春季。

产云南(金平、麻栗坡)。生于深峡谷溪岸丛林中或林缘,海拔 500—1000 米。模式标本采自金平。

此种和华南地区及越南产的疏花臀果木 *Py. laxiflorum* Merr. ex Li 相近,但后者叶片卵状披针形或披针形,长 7—10 厘米,宽 2—3.5 厘米,先端渐尖至尾状渐尖,基部楔形;果实扁卵球形或横向短长圆形,长 7—10 毫米,宽 9—12 毫米。两种易于识别。



1—2. 云南臀果木 *Pygeum henryi* Dunn: 1. 花; 2. 果实。3—5. 臀果木 *Pygeum topengii* Merr.: 3. 花枝; 4. 花; 5. 果实。6—8. 长圆臀果木 *Pygeum oblongum* Yü et Lu: 6. 花枝; 7. 花; 8. 果实。9—10. 大果臀果木 *Pygeum macrocarpum* Yü et Lu: 9. 叶片; 10. 果实。

(吴彰桦绘)