

-14. 槐树 *A. chinensis* (Osbeck) Merr.
11. 叶两面被毛, 中脉偏于上缘。
15. 羽片 3 对, 小叶长 15—25 毫米, 宽 7—10 毫米
- 15. 巧家合欢 *A. duclouxii* Gagnep.
15. 羽片 3—20 对, 小叶长 10—15 毫米, 宽 3—7 毫米。
16. 小叶 6—20 对, 菱状长圆形; 花瓣仅基部连合
- 16. 南洋楸 *A. falcata* (Linn.) Fosberg
16. 小叶 8—15 对, 镰状长圆形; 花瓣大部连合
- 17. 毛叶合欢 *A. mollis* (Wall.) Boiv.

1. 天香藤(广州植物志) 刺藤(中国高等植物图鉴)、藤山丝

Albizia corniculata (Lour.) Druce in Rept. Bot. Exch. Club Brit. Isles 4: 603. 1917; 陈焕镛等, 海南植物志 2: 208. 图 409. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 321. 1972. — *Mimosa corniculata* Lour. Fl. Cochinch 651. 1790. — *Albizia millettii* Benth in London Journ. Bot. 3: 89. 1844; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 90. 1913.

攀援灌木或藤本, 长约 20 余米; 幼枝稍被柔毛, 在叶柄下常有 1 枚下弯的粗短刺。托叶小, 脱落。二回羽状复叶, 羽片 2—6 对; 总叶柄近基部有压扁的腺体 1 枚; 小叶 4—10 对, 长圆形或倒卵形, 长 12—25 毫米, 宽 7—15 毫米, 顶端极钝或有时微缺, 或具硬细尖, 基部偏斜, 上面无毛, 下面疏被微柔毛; 中脉居中。头状花序有花 6—12 朵, 再排成顶生或腋生的圆锥花序; 总花梗柔弱, 疏被短柔毛, 长 5—10 毫米; 花无梗; 花萼长不及 1 毫米, 与花冠同被微柔毛; 花冠白色, 管长约 4 毫米, 裂片长 2 毫米; 花丝长 1 厘米。荚果带状, 长 10—20 厘米, 宽 3—4 厘米, 扁平, 无毛; 种子 7—11 颗, 长圆形, 褐色。花期 4—7 月; 果期 8—11 月。

产广东、广西、福建。生于旷野或山地疏林中, 常攀附于树上。越南、老挝、柬埔寨亦有分布。

2. 黄豆树(广东) 菲律宾合欢(海南植物志), 白格(广东) 图版 20: 1—5

Albizia procera (Roxb.) Benth. in London Journ. Bot. 3: 89. 1844; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 299. 1878; Rock, Legum. Pl. Hawaii 17. pl. 4. 1920. — *Mimosa procera* Roxb. Pl. Corom. 2: 12, t. 121. 1798.

落叶乔木, 高 10—25 米, 无刺; 小枝略被短柔毛或近无毛。二回羽状复叶; 总叶柄近基部有 1 枚长圆形大腺体; 羽片 3—5 对, 长 15—20 厘米; 小叶 6—12 对, 近革质, 先端圆钝或微凹, 基部偏斜, 两面疏被伏贴短柔毛, 中脉偏于下缘; 叶柄长约 2 毫米。头状花序在枝顶或叶腋排成圆锥花序; 花无梗; 花萼长 2—3 毫米, 无毛; 花冠黄白色, 长约 6 毫米, 裂片披针形, 长约 2.5 毫米, 顶部被柔毛; 子房近无柄。荚果带形, 长 10—15 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 扁平, 无毛, 有种子 8—12 颗。花期 5—9 月; 果期 9 月至翌年 2 月。

产台湾、广东、广西。生于低海拔疏林或灌丛中。南亚至东南亚均有分布。