

1944. (excl. spec. fl. fasc. et min. fr. viridi)

乔木,高6—16米,胸径达30厘米;树皮和小枝灰黑色。叶较大,厚纸质或近革质,心脏形或三角状圆形,长5—12厘米,宽4.5—11.5厘米,先端钝或急尖,基部浅心形至深心形,幼叶常呈紫红色,成长后绿色,上面光亮,下面无毛或基部脉腋间常有簇生柔毛;基脉(5—)7条;叶柄长2—4.5厘米。总状花序短,总轴长0.5—1厘米,有花数十余朵;花淡紫红色或粉红色,先于叶或与叶同时开放,稍大,长1.3—1.5厘米,花梗细长,长1—2.3厘米。荚果狭长圆形,紫红色,长9—14厘米,少数短于9厘米,宽1.2—1.5厘米,翅宽约2毫米,先端渐尖,基部圆钝,二缝线不等长,背缝稍长,向外弯拱,少数基部渐尖而缝线等长;果颈长2—3毫米;种子1—8颗,近圆形,扁,长6—7毫米,宽5—6毫米。花期3—4月;果期9—11月。

产湖北西部至西北部、河南西南部、陕西西南部至东南部、四川东北部至东南部、云南、贵州、广西北部、广东北部、湖南、浙江、安徽等省区。生于海拔600—1900米的山地疏林或密林中,山谷、路边或岩石上。

4. 紫荆(开宝本草) 裸枝树(中国主要植物图说——豆科), 紫珠(本草拾遗) 图版48: 5—7

**Cercis chinensis** Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 2: 95. 1833; H. L. Li in Bull. Torrey Bot. Club 71: 423. 1944. (excl. spec. brevi racem. et majore fr. purpureo)——*C. pauciflora* Li, op. cit. 425.——*C. chinensis* Bunge f. *rosea* Hsu in Acta Phytotax. Sin. 11: 193. 1966.


4a. 紫荆(原变型) 图版22: 5—7

f. **chinensis**

丛生或单生灌木,高2—5米;树皮和小枝灰白色。叶纸质,近圆形或三角状圆形,长5—10厘米,宽与长相若或略短于长,先端急尖,基部浅至深心形,两面通常无毛,嫩叶绿色,仅叶柄略带紫色,叶缘膜质透明,新鲜时明显可见。花紫红色或粉红色,2—10余朵成束,簇生于老枝和主干上,尤以主干上花束较多,越到上部幼嫩枝条则花越少,通常先于叶开放,但嫩枝或幼株上的花则与叶同时开放,花长1—1.3厘米;花梗长3—9毫米;龙骨瓣基部具深紫色斑纹;子房嫩绿色,花蕾时光亮无毛,后期则密被短柔毛,有胚珠6—7颗。荚果扁狭长形,绿色,长4—8厘米,宽1—1.2厘米,翅宽约1.5毫米,先端急尖或短渐尖,喙细而弯曲,基部长渐尖,两侧缝线对称或近对称;果颈长2—4毫米;种子2—6颗,阔长圆形,长5—6毫米,宽约4毫米,黑褐色,光亮。花期3—4月;果期8—10月。

产我国东南部,北至河北,南至广东、广西,西至云南、四川,西北至陕西,东至浙江、江苏和山东等省区。为一常见的栽培植物,多植于庭园、屋旁、寺庙边,少数生于密林或石灰岩地区。模式标本采自北京(栽培植物)。

本种是一美丽的木本花卉植物。树皮可入药,有清热解暑,活血行气,消肿止痛之功



1—4. 垂丝紫荆 *Cercis racemosa* Oliv.: 1. 果枝 2. 花序, 3. 花, 4. 花除去花瓣示雄蕊和雌蕊。  
 5—7. 紫荆 *Cercis chinensis* Bunge: 5. 叶 6. 花枝一部分, 7. 果。  
 8—9. 黄山紫荆 *Cercis chingii* Chun: 8. 叶, 9. 果。  
 10—11. 湖北紫荆 *Cercis glabra* Pampan.: 10. 花枝, 11. 果。(邓盈丰绘)