

原产印度。我国广东有栽培。

本种为美丽的庭园观赏灌木，在印度全年开花。根皮和花用以治疗痢疾，亦可为溃疡外敷药；种子可榨油；木材纹理细，可做农具及枪托。

6. 洋紫荆(广州) 羊蹄甲、红紫荆、红花紫荆、弯叶树

Bauhinia variegata Linn. Sp. Pl. 375. 1753; L. Chen in Lingnan Sci. Journ. 18: 484. 1939; 侯宽昭等, 广州植物志 313, 图 167. 1956; 陈焕镛等, 海南植物志 2: 218. 1965, in nota.——*B. variegata* Linn. *chinensis* DC. Prodr. 2: 514. 1825.——*Phanera variegata* (Linn.) Benth. Pl. Jungh. 2: 262. 1825.

6a. 洋紫荆(原变种) 图版 50:6

var. **variegata**

落叶乔木；树皮暗褐色，近光滑；幼嫩部分常被灰色短柔毛；枝广展，硬而稍呈之字曲折，无毛。叶近革质，广卵形至近圆形，宽度常超过于长度，长 5—9 厘米，宽 7—11 厘米，基部浅至深心形，有时近截形，先端 2 裂达叶长的 1/3，裂片阔，钝头或圆，两面无毛或下面略被灰色短柔毛；基出脉(9—)13 条；叶柄长 2.5—3.5 厘米，被毛或近无毛。总状花序侧生或顶生，极短缩，多少呈伞房花序式，少花，被灰色短柔毛；总花梗短而粗；苞片和小苞片卵形，极早落；花大，近无梗；花蕾纺锤形；萼佛焰苞状，被短柔毛，一侧开裂为一广卵形、长 2—3 厘米的裂片；花托长 12 毫米；花瓣倒卵形或倒披针形，长 4—5 厘米，具瓣柄，紫红色或淡红色，杂以黄绿色及暗紫色的斑纹，近轴一片较阔；能育雄蕊 5，花丝纤细，无毛，长约 4 厘米；退化雄蕊 1—5，丝状，较短；子房具柄，被柔毛，尤以缝线上被毛较密，柱头小。荚果带状，扁平，长 15—25 厘米，宽 1.5—2 厘米，具长柄及喙；种子 10—15 颗，近圆形，扁平，直径约 1 厘米。花期全年，3 月最盛。

产我国南部。印度、中南半岛有分布。

花美丽而略有香味，花期长，生长快，为良好的观赏及蜜源植物，在热带、亚热带地区广泛栽培。木材坚硬，可作农具；树皮含单宁；根皮用水煎服可治消化不良；花芽、嫩叶和幼果可食。

6b. 白花洋紫荆(变种)(海南植物志) 大白花(云南)

var. **candida** (Roxb.) Voigt in Hort. Suburb. Calc. 253. 1845. ——*B. candida* Roxb. Fl. Ind. 2: 344. 1824——*B. variegata* Linn. var. *candida* (Roxb.) Corner, Ways. Trees Malay. 1: 383. 1940——*B. variegata* Linn. var. *alboflava* de Wit in Reinwardtia 3: 412. 1956; 陈焕镛等, 海南植物志 2: 217. 1965.

花瓣白色，近轴的一片或有时全部花瓣均杂以淡黄色的斑块；花无退化雄蕊；叶下面通常被短柔毛。

与洋紫荆的分布大致相同。

常栽培于庭园供观赏。云南常见有野生的。花可食。