

639. 图 619. 1955; Breteler in *Blumea* 10: 617. 1960; 海南植物志 2: 297. 图 444. 1965; Verdc. in *Kew Bull.* 24: 240. 1970; 台湾植物志 3: 152. 图 505. 1977.

藤本。茎细弱，多分枝，被锈疏白色糙伏毛。羽状复叶；小叶 8—13 对，膜质，对生，近长圆形，长 1—2 厘米，宽 0.4—0.8 厘米，先端截形，具小尖头，基部近圆形，上面无毛，下面被稀疏白色糙伏毛；小叶柄短。总状花序腋生，长 3—8 厘米；花序轴粗短；花小，密集成头状；花萼钟状，萼齿 4 浅裂，被白色糙毛；花冠紫色，旗瓣柄三角形，翼瓣与龙骨瓣较窄狭；雄蕊 9；子房被毛。荚果长圆形，果瓣革质，长 2—3.5 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，成熟时开裂，有种子 2—6 粒；种子椭圆形，平滑具光泽，上部约三分之二为鲜红色，下部三分之一为黑色。花期 3—6 月，果期 9—10 月。

产台湾、广东、广西、云南。生于山地疏林中。广布于热带地区。

种子质坚，色泽华美，可做装饰品，但有剧毒，外用治皮肤病；根、藤入药，可清热解毒和利尿。

2. 美丽相思子 (中国主要植物图说·豆科) 土甘草 (广西) 图版 33: 4—7

Abrus pulchellus Wall. [Cat. n. 5819. 1831, nom. nud.] ex Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 91. 1859; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 175. 1876; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 359. 1916; 中国主要植物图说·豆科 640. 图 629. 1955; Verdc. in *Kew Bull.* 24: 246. 1970. — *A. fruticulosus* auct. non Wight et Arn.: Breteler in *Blumea* 10: 612. 1960, p. p.


攀援藤本。茎枝细弱，被稀疏黄色糙伏毛。羽状复叶互生；小叶 6—10 对，膜质，近长圆形，长 0.7—3 厘米，宽 0.4—1 厘米，先端截形，具小尖头，基部近圆形，上面无毛，下面被稀疏白色糙伏毛；小叶柄短。总状花序腋生；总花梗长 3—10 厘米，花序轴粗短；花小，长 0.6—0.8 厘米，密集成头状；萼钟状，萼齿 4 浅裂，被白色糙伏毛；花冠粉红色或紫色；雄蕊 9。荚果长圆形，长 5—6.5 厘米，宽 0.8—1.5 厘米，成熟时开裂，密被平伏白毛，有种子 6—12 粒；种子椭圆形，黑褐色，具光泽，种阜明显，环状，种脐有孔。

产广西、云南。生于河谷岸边灌丛或平原疏林中，海拔 400—3 000 米。锡金、斯里兰卡、马来西亚、几内亚也有分布。

叶、根可药用。花果有毒。

3. 毛相思子 (广州植物志) 蜻蜓藤、油甘藤、毛鸡骨草、金不换 图版 33: 8—9

Abrus mollis Hance in Journ. Bot. 9: 130. 1871; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 187, 1887; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 360. 1916; 中国主要植物图说·豆科 641. 图 621. 1955; 广州植物志 354. 1956; 海南植物志 2: 297. 1965. — *A. pulchellus* subsp. *mollis* (Hance) Verdc. in *Kew Bull.* 24: 248. 1970. — *A. fruticulosus* auct. non Wight et Arn.: Breteler in *Bulmea* 10: 612. 1960, p. p.



图版 33 1—3. 相思子 *Abrus precatorius* Linn.: 1. 果枝; 2. 小叶片 (示毛); 3. 种子。4—7. 美丽相思子 *Abrus pulchellus* Wall. ex Thwaites: 4. 果枝; 5. 小叶片 (示毛); 6. 荚果; 7. 种子。8—9. 毛相思子 *Abrus mollis* Hance: 8. 果枝; 9. 种子。10—12. 广州相思子 *Abrus cantoniensis* Hance: 10. 果枝; 11. 小叶片 (示毛); 12. 种子。(蔡淑琴绘)