

藤本。茎疏被黄色长柔毛。羽状复叶；叶柄和叶轴被黄色长柔毛；托叶钻形；小叶 10—16 对，膜质，长圆形，最上部两枚常为倒卵形，长 1—2.5 厘米，宽 0.5—1 厘米，先端截形，具细尖，基部圆或截形，上面被疏柔毛，下面密被白色长柔毛。总状花序腋生；总花梗长 2—4 厘米，被黄色长柔毛，花长 3—9 毫米，4—6 朵聚生于花序轴的节上；花萼钟状，密被灰色长柔毛；花冠粉红色或淡紫色，荚果长圆形，扁平，长 3—5 (—6) 厘米，宽 0.8—1 厘米，密被白色长柔毛，顶端具喙，有种子 4—9 粒；种子黑色或暗褐色，卵形，扁平，稍有光泽，种阜小，环状，种脐有孔。花期 8 月，果期 9 月。

产福建、广东、广西。生于山谷、路旁疏林、灌丛中，海拔 200—1 700 米。中南半岛也有分布。

种子有剧毒。

4. 广州相思子 (广州植物志) 鸡骨草 (广东、广西)，地香根 (广东)，山弯豆 (广西) 图版 33: 10—12

Abrus cantoniensis Hance in Journ. Bot. 6: 112. 1868; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 187. 1887; Craib, Contrib. Fl. Siam 62. 1912; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 358. 1916; 中国主要植物图说·豆科 641. 1955; 广州植物志 354. 1956. — *A. pulchellus* subsp. *cantoniensis* (Hance) Verdc. in Kew Bull. 24: 248. 1970. — *A. fruticosus* auct. non Wight et Arn.: Breteler in Blumea 10: 612. 1960, p. p.

攀援灌木，高 1—2 米。枝细直，平滑，被白色柔毛，老时脱落。羽状复叶互生；小叶 6—11 对，膜质，长圆形或倒卵状长圆形，长 0.5—1.5 厘米，宽 0.3—0.5 厘米，先端截形或稍凹缺，具细尖，上面被疏毛，下面被糙伏毛，叶腋两面均隆起；小叶柄短。总状花序腋生；花小，长约 6 毫米，聚生于花序总轴的短枝上；花梗短；花冠紫红色或淡紫色。荚果长圆形，扁平，长约 3 厘米，宽约 1.3 厘米，顶端具喙，被稀疏白色糙伏毛，成熟时浅褐色，有种子 4—5 粒。种子黑褐色，种阜蜡黄色，明显，中间有孔，边具长圆状环。花期 8 月。


产湖南、广东、广西。生于疏林、灌丛或山坡，海拔约 200 米。泰国也有分布。

常根全株及种子均供药用，可清热利湿，舒肝止痛，用于急慢性肝炎及乳腺炎。

IV. 灰毛豆族 Trib. *TEPHROSIEAE* (Benth.) Hutch.

Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 394. 1964; Geesink in Polhill & Raven, Adv. Leg. Syst. 1: 245. 1981. — *Galegeae* Subtrib. *Tephrosiinae* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 444. 1865. — *Millettieae* Hutch. l. c. 375.

乔木、灌木、藤本或草本。奇数羽状复叶；小叶对生，全缘。花数朵着生节上，排成



图版 33 1—3. 相思子 *Abrus precatorius* Linn.: 1. 果枝; 2. 小叶片 (示毛); 3. 种子。4—7. 美丽相思子 *Abrus pulchellus* Wall. ex Thwaites: 4. 果枝; 5. 小叶片 (示毛); 6. 荚果; 7. 种子。8—9. 毛相思子 *Abrus mollis* Hance: 8. 果枝; 9. 种子。10—12. 广州相思子 *Abrus cantoniensis* Hance: 10. 果枝; 11. 小叶片 (示毛); 12. 种子。(蔡淑琴绘)