

卵形，长约 8 厘米，径约 3.5 厘米，密被淡黄色柔毛，果瓣凸起，有种子 1 粒；种子栗褐色，长约 1.8 厘米，径约 1.4 厘米，光亮，种脐圆形，宽约 3 毫米，具种阜。花期 5—10 月，果期 7—11 月。

产广西、贵州、云南。生于山谷杂木林中。海拔 200—1 000 米。越南也有分布。

11. 猪腰豆属* *Whitfordiodendron* Elm.

Elm. in *Leaflets Philip. Bot.* 2: 743. 1910; *Dunn in Kew Bull.* 363. 1912; 中国主要植物图说·豆科 294. 1955. — *Whitfordia* *Elm.* l. c. 689, non *Murrill* 1908. — *Adinobotrys* *Dunn in Kew Bull. Misc. Inform.* 194. 1911.

攀援灌木，偶为乔木（我国不产）。奇数羽状复叶互生；叶枕膨大；托叶早落；小叶多对，近对生。总状圆锥花序，大型，通常腋生或生老茎上，甚密集；苞片大，花期宿存，甚显著，小苞片细；花萼具 5 短齿，上方 2 齿部分合生，圆钝，下方 3 齿三角形；旗瓣圆形，先端圆，基部内侧具耳，有 2 囊状胼胝体，翼瓣与龙骨瓣近同形，圆头，基部内侧有耳，具长瓣柄；雄蕊二体，对旗瓣的 1 枚离生，其余 9 枚连合成雄蕊管，连合部在二分之一以上，花药同型；子房线形，具长柄，密被绒毛，花柱无毛，上弯，柱头头状，顶生。荚果硕大，卵形，果皮厚木质，不开裂；种子单生，甚大，形如猪肾，肿脐居中。

本属模式种：*Whitfordiodendron scandens* *Elm.*

约 9 种，分布菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和澳大利亚。我国有 1 种，1 变种，产我国南部和西南部。

本属有的学者将其并于 *Millettia*，有的主张与 *Padbruggea* 合并。

1. 猪腰豆 大荚藤（中国高等植物图鉴），细梗惠特木（中国主要植物图说·豆科），猪腰子（本草纲目）

Whitfordiodendron filipes (*Dunn*) *Dunn in Kew Bull. Misc. Inform.* 364. 1912; 中国主要植物图说·豆科 294. 1955. — *Adinobotrys filipes* *Dunn in Kew Bull. Misc. Inform.* 195. 1911. — *Padbruggea filipes* (*Dunn*) *Craib, Fl. Siam. Enum.* 1: 397. 1928.

1a. 猪腰豆（原变种） 图版 35: 1—11

var. *filipes*

大型攀援灌木；长达 20 余米。嫩茎圆柱形，密被银灰色平伏绢毛或红色直立髯毛，皮赭黄色，光滑无毛，折断时有红色液汁，老茎树皮条裂，灰褐色。羽状复叶长 25—35 厘米；叶柄长占 5—8 厘米；托叶狭三角状线形，长约 6 毫米，先端长渐尖，脱落；小叶

* 属的异名：大荚藤属