

下面密被黄色绢毛，后者密被灰色毡毛而不同。

15. 印度崖豆 (植物分类学报) 印度鸡血藤 (广州植物志)，美花崖豆藤 (中国主要植物图说·豆科)

Millettia pulchra (Benth.) Kurz in Journ. As. Soc. Beng. 42(2): 69. 1873; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 104. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 150. 1912; 中国主要植物图说·豆科 287. 1955; 海南植物志 2: 260. 1965. — *Tephrosia pulchra* Colebr. in Wall. Cat. n. 5630. 1831, nom. nud. — *Mundulea pulchra* Benth. in Miq. Pl. Jungh. 248. 1852. — *Tephrosia tutcheri* Dunn in Journ. Bot. 47: 197. 1909.

变种检索表

1. 小叶上面被细柔毛。
 2. 小叶较大且宽，通常长5厘米以上。
 3. 小叶披针状椭圆形，先端渐尖，侧脉7—10对。
 4. 小叶下面被平伏柔毛…………… 15b. 疏叶崖豆 var. *laxior* (Dunn) Z. Wei
 4. 小叶下面被灰色毡毛…………… 15d. 绒毛印度崖豆 var. *tomentosa* Prain
 3. 小叶长圆形，先端锐尖，基部两侧不等大，侧脉6—7对，上面凹陷…………… 15e. 云南崖豆 var. *yunnanensis* (Pamp.) Dunn
 2. 小叶较小且狭，通常长3.5厘米以下。
 5. 小叶披针形，侧脉5—6对，上面平坦…………… 15a. 印度崖豆 var. *pulchra*
 5. 小叶狭椭圆形，侧脉6—7对，中脉在上面凹陷…………… 15c. 华南小叶崖豆 var. *chinensis* Dunn
1. 小叶上面无毛，嫩时中脉和叶缘具长柔毛。
 6. 小叶卵形，基部两侧不等大，长1.2—1.8厘米…………… 15f. 景东小叶崖豆 var. *parvifolia* Z. Wei
 6. 小叶长圆状披针形，长2—6厘米…………… 15g. 台湾小叶崖豆 var. *microphylla* Dunn

15a. 印度崖豆 (原变种) 图版 46: 1—3

var. *pulchra* — *M. pulchra* Kurz var. *typica* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 151. 1912.

灌木或小乔木，高3—8米；树皮粗糙，散布小皮孔。枝、叶轴、花序均被灰黄色柔毛，后渐脱落。羽状复叶长8—20厘米；叶柄长3—4厘米，叶轴上面具沟；托叶披针形，长约2毫米，密被黄色柔毛；小叶6—9对，间隔约2厘米，纸质，披针形或披针状椭圆形，长2—6厘米，宽7—15毫米，先端急尖，基部渐狭或钝，上面暗绿色，具稀疏细毛，下面浅绿色，被平伏柔毛，中脉隆起，侧脉4—6对，直达叶缘弧曲，细脉不明显；小叶柄长约2毫米，被毛；小托叶刺毛状，长1—3毫米，被毛。总状圆锥花序腋生，长6—15厘米，短于复叶，密被灰黄色柔毛，生花节短，长1—2毫米，远离；花3—4朵着生节上；苞片小，披针形，小苞片小，贴萼生；花长0.9—1.2厘米；花梗细，长