

产云南。缅甸北部也有分布。

15f. 景东小叶崖豆 (变种) (植物分类学报) 图版 46: 8

var. *parvifolia* Z. Wei in Act. Phytotax. Sin. 23: 281. 1985.

本变种与原变种区别在于: 小叶甚小, 长 1.2—1.8 厘米, 基部近心形, 两侧不等大。

产云南 (景东)。生于山坡杂木林下, 海拔 1700 米左右。模式标本采自景东。

15g. 台湾小叶崖豆 (变种) 图版 46: 9

var. *microphylla* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 152. 1912; 中国主要植物图说·豆科 289. 1955; 台湾植物志 3: 341. 1977.

本变与原变种的区别是: 小叶上面无毛, 下面被灰白色长柔毛, 侧脉 4—5 对, 不清晰。

产台湾南部。

16. 香港崖豆 香港崖豆藤 (中国主要植物图说·豆科) 图版 45: 10—17

*Millettia oraria* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 149. 1912; 中国主要植物图说·豆科 286. 1955.

直立灌木或小乔木; 树皮光滑。小枝灰黑色, 具纵棱, 密被灰色绒毛, 皮孔散布, 凸起, 裂口被白粉。羽状复叶长 15—20 厘米; 叶柄长 3.5—4.5 厘米, 叶轴密被黄色绒毛, 上面有宽沟; 托叶披针形, 长 2—3 毫米, 贴茎生; 小叶 (3—) 4—6 (—7) 对, 间隔 1—2 厘米, 纸质, 椭圆形或阔卵形, 长 4—5.5 厘米, 宽 2—3 厘米, 先端圆钝, 基部圆形或近心形, 上面密被柔毛, 但可见叶面, 下面密被绒毛, 侧脉 6—7 对, 直达叶缘, 细脉不明显; 小叶柄长约 2 毫米, 密被绒毛; 小托叶针刺状, 长约 2 毫米, 被毛。总状圆锥花序腋生, 聚集于枝梢, 长 6—15 厘米, 短于复叶, 密被黄色绒毛, 生花节短; 花 1—3 朵着生节上; 苞片小小苞片均小, 披针形; 花长 8—11 毫米; 花梗长约 1 厘米; 花萼钟状, 长约 3 毫米, 宽约 3 毫米, 与花梗被同样绒毛, 萼齿阔三角形, 短于萼筒; 花冠紫红色, 旗瓣被细柔毛, 近圆形, 瓣柄短, 翼瓣长圆状镰形, 龙骨瓣阔卵形, 基部截平; 雄蕊二体; 子房线形, 密被绢毛, 花柱短, 向上弯曲, 胚珠 2—4 粒。荚果线形, 长 5—9 厘米, 宽 1—1.5 厘米, 扁平, 密被褐色绒毛, 渐稀疏, 瓣裂, 有种子 2—3 粒; 种子橙黄色, 扁圆形, 种阜环绕珠柄, 白色, 薄片状。花期 5 月, 果期 11 月。

产广东、广西沿海地区。模式标本采自香港。


组 4. 棒果组 Sect. *Corynecarpae* Z. Wei in Act. Phytotax. Sin. 23: 281. 1985.

本组模式种: *Millettia speciosa* Champ.

我国产 4 种。

17. 滇桂崖豆藤 (中国主要植物图说·豆科) 图版 42: 6—13

*Millettia bonatiana* Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 17: 24. 1910; Dunn in



图版 46 1—3. 印度崖豆 *Millettia pulchra* Kurz: 1. 花枝; 2. 荚果; 3. 种子。4. 疏叶崖豆 *Millettia pulchra* Kurz var. *laxior* (Dunn) Z. Wei 叶片。5. 华南小叶崖豆 *Millettia pulchra* Kurz var. *chinensis* Dunn 叶片。6. 绒叶印度崖豆 *Millettia pulchra* Kurz var. *tomentosa* Prain 叶片。7. 云南崖豆 *Millettia pulchra* Kurz var. *yunnanensis* (Pamp.) Dunn 叶片。8. 景东小叶崖豆 *Millettia pulchra* Kurz var. *parvifolia* Z. Wei 复叶。9. 台湾小叶崖豆 *Millettia pulchra* Kurz var. *microphylla* Dunn 叶片。(何冬泉绘)