

米，宽约 5 毫米，被绒毛，萼齿圆钝，短于萼筒；花冠黄色，花瓣近等长，旗瓣无毛，阔卵形，近基部具 2 胼胝体，翼瓣戟形，圆头，龙骨瓣长圆形，圆头；雄蕊二体，对旗瓣的 1 枚离生；花盘筒状；子房线形，密被绒毛，具柄，胚珠多数。荚果线形，长 10—12 厘米，宽 1 厘米，扁平，顶端截尖，基部具颈，密被黄褐色绒毛，瓣裂，有种子 4—8 粒；种子褐色，卵形，长约 7 毫米，宽约 6 毫米，光滑。花期 9—10 月，果期 11 月。

产广东、广西。生于山谷疏林中，海拔 500 米左右。模式标本采自广东连县。

组 5. 短柱组 Sect. *Eurybotryae* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 155. 1912; Z. Wei in Act. Phytotax. Sin. 23: 282. 1985.

本组模式种: *Millettia eurybotrya* Drake

我国有 4 种。

21. 宽序崖豆藤 (云南种子植物名录) 图版 49: 1—6

*Millettia eurybotrya* Drake in Morot, Journ. Bot. 5: 187. 1891; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 155. 1912; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 368. 1916; Z. Wei in Act. Phytotax. Sin. 23: 282. 1985.


攀援灌木；树皮光滑。小枝浅黄色，散布不明显皮孔，初被平伏柔毛，后渐脱落，具棱。羽状复叶长 20—25 (—40) 厘米；叶柄长 (3—) 5—6 (—7) 厘米，叶轴稀被柔毛，上面有沟；托叶锥刺状，长 4—6 毫米，基部向下突起成一对尖硬的距；小叶 (2—) 3 对，间隔 2—3 (—5) 厘米，纸质，卵状长圆形或披针状椭圆形，长 6—16 厘米，宽 2.5—8 厘米，先端急尖，基部圆形或阔楔形，两面无毛，暗绿色，侧脉 6—7 对，近叶缘向上弧曲，细脉网状，两面均隆起，甚明显；小叶柄长 3—5 毫米；小托叶针刺状，长约 3 毫米。圆锥花序顶生，长约 30 厘米，生花枝长，开展，长 8—10 厘米，密被黄褐色绒毛；花单生；苞片与小苞片卵状披针形，长约 2 毫米；花长 1.4—1.5 厘米；花梗长 4—8 毫米；花萼钟状至杯状，长约 4 毫米，宽约 5 毫米，密被平伏绒毛，萼齿短，阔三角形；花冠紫红色，花瓣近等长，旗瓣无毛，圆形径约 12 毫米，基部渐狭延至瓣柄，中央具黄绿色斑晕，无胼胝体，翼瓣镰形，狭尖头，基部具两小耳，龙骨瓣锐尖头；雄蕊二体，对旗瓣的 1 枚离生；花盘筒状；子房线形，无毛，花柱很短，上弯，胚珠多数。荚果长圆形，长 10—11 厘米，宽 2—3 厘米，顶端喙尖，肿胀，缝线增厚，种子间稍缢缩，瓣片木质，有种子 1—7 粒；种子棕色，椭圆形，宽约 2 厘米，种脐厚，白色。花期 7—8 月，果期 9—11 月。

产湖南、广东、广西、贵州、云南。生于山谷、溪沟旁或疏林中，海拔 1200 米以下，越南、老挝也有分布。

茎有毒，外用治疮毒、祛风湿；根治白带、便血。

22. 网络崖豆藤 (植物分类学报) 昆明鸡血藤 (植物名实图考)

*Millettia reticulata* Benth. in Miq. Pl. Jungh. 249. 1853; Dunn in Journ. Linn.



图版 49 1—6. 宽序崖豆藤 *Millettia eurybotrys* Drake.: 1. 小叶片; 2. 旗瓣; 3. 翼瓣; 4. 龙骨瓣; 5. 果序; 6. 种子。7—14. 网络崖豆藤 *Millettia reticulata* Benth.: 7. 花枝; 8. 花; 9. 旗瓣; 10. 翼瓣; 11. 龙骨瓣; 12. 去花瓣、雄蕊的花; 13. 荚果; 14. 种子。15. 线叶崖豆藤 *Millettia reticulata* Benth. var. *stenophylla* Merr. et Chun 小叶片。(何冬泉绘)