

子房线形，密被绒毛，花柱旋曲，柱头下指，胚珠 6 粒。荚果菱形至长圆形，长 3.5—8 厘米，宽约 2.2 厘米，密被深褐色绒毛，渐脱落；顶端具弯喙，常扭曲，种子间稍缢缩，有种子 1—3 粒；种子红褐色，长约 1.5 厘米，宽约 2 厘米，厚约 0.8 厘米，种脐偏于一边。花期 5—8 月，果期 7—10 月。

产广西、贵州、云南。生于山坡或谷地茂密的常绿阔叶林中，海拔 1400 米。模式标本采自广西乐业。

### 33. 亮叶崖豆藤 (中国主要植物图说·豆科)

*Millettia nitida* Benth. in Lond. Journ. Bot. 1: 484. 1842; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 41: 161. 1912; 中国主要植物图说·豆科 284. 1955; 海南植物志 2: 262. 1965. — *M. kueichouensis* Hu in Act. Phytotax. Sin. 3: 356. 1954.

## 变种检索表

1. 小叶长圆形或阔披针形，上面光亮，下面无毛或稀疏柔毛。
  2. 小叶较大，硬纸质，宽 3—4 厘米，叶轴粗壮；花大，长 1.8—2.5 厘米 ..... 33a. 亮叶崖豆藤 var. *nitida*
  2. 小叶较小，纸质，宽 1.5—2 厘米，叶轴较细；花较小，长 1.4—1.8 厘米 ..... 33b. 峨眉崖豆藤 var. *minor* Z. Wei
1. 小叶卵形，上面暗淡无光，下面密被红褐色硬毛；花较小，长 1.4—1.8 厘米 ..... 33c. 丰城崖豆藤 var. *hirsutissima* Z. Wei

### 33a. 亮叶崖豆藤 (原变种) 图版 54: 1—8

#### var. *nitida*

攀援灌木。茎皮锈褐色，粗糙，枝初被锈色细毛，后秃净。羽状复叶长 15—20 厘米；叶柄长 3—6 厘米，叶轴疏被短毛，渐秃净，上面有狭沟；托叶线形，长约 5 毫米，脱落；小叶 2 对，间隔 2—3 厘米，硬纸质，卵状披针形或长圆形，长 5—9 (—11) 厘米，宽 (2—) 3—4 厘米，先端钝尖，基部圆形或钝，上面光亮无毛，有时中脉有毛，下面无毛或被稀疏柔毛，侧脉 5—6 对，达叶喙向上弧曲，细脉网状，两面均隆起；小叶柄长约 3 毫米；小托叶锥刺状，长约 2 毫米。圆锥花序顶生，粗壮，长 10—20 厘米，密被锈褐色绒毛，生花枝通直，粗壮，长 6—10 厘米；花单生；苞片卵状披针形，小苞片卵形，均早落；花长 1.6—2.4 厘米；花梗长 4—8 毫米；花萼钟状，长 6—8 毫米，宽约 5—6 毫米，密被绒毛，萼短于萼筒，上方 2 齿几全合生，其余呈三角形，下方 1 齿最长；花冠青紫色，旗瓣密被绢毛，长圆形，近基部具 2 胼胝体，翼瓣短而直，基部戟形，龙骨瓣镰形，瓣柄长占三分之一；雄蕊二体，对旗瓣的 1 枚离生；花盘皿状；子房线形，具柄，密被绒毛，花柱旋曲，柱头下指，胚珠 4—8 粒。荚果线状长圆形，长 10—14 厘米，宽 1.5—2 厘米，密被黄褐色绒毛，顶端具尖喙，基部具颈，瓣裂；有种子 4—5 粒；种子栗