

下侧有耳，龙骨瓣镰形；雄蕊二体，对旗瓣的1枚离生；花盘浅皿状；子房线形，密被绒毛，花柱长于子房，旋曲，柱头下指，胚珠8—9粒。荚果线形至长圆形，长7—12厘米，宽1.5—2厘米，扁平，密被灰色绒毛，果瓣薄，近木质，瓣裂，有种子3—5粒；种子长圆状凸镜形，长约8厘米，宽约6厘米，厚约2厘米。花期5—9月，果期6—11月。

产陕西（南部）、甘肃（南部）、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。生于山坡杂木林与灌丛中，或谷地、溪沟和路旁，海拔2500米。越南、老挝也有分布。模式标本采自四川南川。

本变种的花序、花和小叶形状有较大幅度的变化，旗瓣背面密被褐色绢毛，干后有时呈银白色，花长1.2—2.4厘米，随花期和生境的不同而异。荚果无果颈，被灰色绒毛，后渐秃净，是其特点。

35b. 异果崖豆藤（变种）（植物分类学报） 图版 55: 8—9

var. *heterocarpa* (Chun ex T. Chen) Z. Wei in Act. Phytotax. Sin. 23: 289. 1985.
— *M. heterocarpa* Chun ex T. Chen in Act. Phytotax. Sin. 3: 364. 1954; 中国主要植物图说·豆科 283. 1955.

与原变种不同为：小叶较宽大；果瓣薄革质，种子近圆形。

产江西、福建、广东、广西、贵州。生于山坡杂木林缘或灌丛中。模式标本采自广西。

35c. 雪峰山崖豆藤（变种）（植物分类学报） 图版 55: 10—11

var. *solida* T. Chen ex Z. Wei in Act. Phytotax. Sin. 23: 289. 1985.

与原变种的区别在于：小叶厚纸质，较大，小叶下面和叶轴、嫩枝均被灰黄色硬毛。产湖南（西部）、广西。模式标本采自湖南黔阳。

14. 水黄皮属 *Pongamia* Vent.

Vent. Jard. Malm. 28. t. 28. 1803, nom. conserv.; Hutch. Gen.

Fl. Pl. 1: 383. 1964.

乔木。奇数羽状复叶；小叶对生；无小托叶。花组成腋生的总状花序；苞片小，早落，小苞片微小；花萼钟状或杯状，顶端截平；花冠伸出萼外，旗瓣近圆形，基部两侧具耳，在瓣柄上有2枚附属物，翼瓣偏斜，长椭圆形，具耳，龙骨瓣镰形，先端钝，并在上部连合；雄蕊10，通常9枚合生成雄蕊管，对旗瓣的1枚离生，花药基着；子房近无柄，有胚珠2粒，花柱上弯，无毛，柱头头状，顶生。荚果椭圆形或长椭圆形，扁平，果瓣厚革质或近木质，有种子1粒。

本属模式种：*Pongamia pinnata* (Linn.) Pierre

仅1种，分布于亚洲南部、东南亚、大洋洲及太平洋热带。我国南部有产。