

方3齿卵状三角形；花冠细绢毛，上方2齿甚钝，下方3齿卵状三角形；花冠紫色，旗瓣圆形，先端略凹陷，花开后反折，基部有2胼胝体，翼瓣长圆形，基部圆，龙骨瓣较翼瓣短，阔镰形，子房线形，密被绒毛，花柱无毛，上弯，胚珠6—8粒。荚果倒披针形，长10—15厘米，宽1.5—2厘米，密被绒毛，悬垂枝上不脱落，有种子1—3粒；种子褐色，具光泽，圆形，宽1.5厘米，扁平。花期4月中旬至5月上旬，果期5—8月。

产河北以南黄河长江流域及陕西、河南、广西、贵州、云南。

本种我国自古即栽培作庭园棚架植物，先叶开花，紫穗满垂缀以稀疏嫩叶，十分优美。野生种略有变异，常见有1个变型。

1b. 白花紫藤 (变型)

f. *alba* (Lindl.) Rehd. et Wils. in Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 2, 507. 1940.

—— *W. sinensis* var. *alba* Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. 4: 221. 1849. ——

W. sinensis var. *albiflora* Lemaire in Ill. Hort. 5: t. 166. 1858.

本变型花白色与原变型不同。

产湖北。南北各地常见栽培。

2. 短梗紫藤 短齿紫藤 (中国主要植物图说·豆科)

Wisteria brevidentata Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 163. 1926, et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 2, 507. 1940; 中国主要植物图说·豆科 297. 1955.

落叶藤本。小枝被平伏长柔毛，二年生枝灰黄色，秃净，老枝灰色；冬芽长约6毫米，外被绢毛。羽状复叶于花期开展，长13—17厘米；叶柄长占3—4厘米，被平伏柔毛；托叶早落；小叶4—5（—6）对，椭圆形或卵状长圆形，长2.5—5厘米，宽1—1.8厘米，先端钝圆，具细尖，基部阔楔形或钝圆，上面疏被硬毛，下面沿中脉被疏散硬毛；小叶柄长2—3毫米，密被长硬毛。总状花序长10—18厘米，花自下而上顺序开放，长1.5厘米；花梗短，长6—12毫米，密被短柔毛；花萼杯状，长3—4毫米，近二唇形，被毛，上方2萼齿儿全连合，钝头，下方3齿三角形，几等长，或最下1齿稍长，萼齿长1.5—2毫米，约为萼筒长的三分之一；花冠紫色，旗瓣近圆形，先端深凹，基部略呈心形，外面近基部被长柔毛，具瓣柄，翼瓣与龙骨瓣阔长圆形，与旗瓣均近等长，龙骨瓣先端深凹；子房线形，被绒毛，花柱无毛，上弯。果未见。

产福建、云南。模式标本采自云南。

各地栽培供观赏。

3. 藤萝 图版 56: 7

Wisteria villosa Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 162. 1926; 中国主要植物图说·豆科 298. 1955. —— *W. chinensis* Bunge in Mem. Div. Sav. Acad. Sci. Petersb. 11: 9494. 1833, non DC. 1825; Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscow 10(7): 151. 1837; Maxim. in Mem. Div. Sav. Acad. Sci. Petersb. 9: 471. 1859. —— *W. brachybotrys* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 161. 1887, non Sieb. et Zucc.